

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 08.09.2026 07:48:17

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра высшей математики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 26 » 03

2026 г.



ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Методические указания к выполнению практических заданий
по дисциплине «Высшая математика»
для студентов всех специальностей и направлений подготовки
очной, очно-заочной и заочной форм обучения

Курск 2026

УДК 51

Составители: К.В.Жилина, Н.А.Конорева

Рецензент

кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры высшей математики *Е.Ю.Машков*

Высшая математика: методические указания к выполнению практических заданий по дисциплине «Высшая математика» для студентов всех специальностей и направлений подготовки очной, очно-заочной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: К.В.Жилина, Н.А.Конорева – Курск, 2026. –97 с.

Излагаются методические рекомендации к выполнению практических заданий по дисциплине «Высшая математика». Содержатся примеры типовых задач с разбором методов их решения, а также контрольные вопросы.

Методические рекомендации соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования для студентов всех специальностей и направлений подготовки очной, очно-заочной и заочной форм обучения

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 26.03.26. Формат 60х84 1/16.
Усл. печ. л. 5,6 . Уч.-изд. л.5,1.Тираж 100 экз. Заказ 348. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Содержание

Введение.....	4
Тема 1. Элементы линейной алгебры.....	5
Тема 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия.....	9
Тема 3. Элементы функционального анализа.....	20
Тема 4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.....	28
Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной.....	37
Тема 6. Дифференциальное исчисление функции многих переменной.....	44
Тема 7. Дифференциальные уравнения	48
Тема 8. Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ.....	55
Тема 9. Интегральное исчисление функций многих переменных. Элементы теории поля.....	68
Тема 10. Элементы теории функций комплексного переменного.....	76
Тема 11, 12. Теория вероятностей и математическая статистика.....	86
Список рекомендуемой литературы.....	97

Введение

Основной формой обучения студентов является самостоятельная работа с учебником и учебными пособиями. Поэтому каждый студент с самого начала занятий должен выработать для себя рациональную систему работы над курсом, постоянно практикуясь при этом в решении задач. В противном случае усвоение и практическое использование материала затруднены. Чрезвычайно важны систематические занятия.

Часто приходится слышать высказывания студентов о том, что теорию они знают, а решать задачи не умеют. Данная работа способствует развитию индивидуального творческого мышления, обеспечивает ритмическую работу студента при изучении разделов высшей математики. Каждый параграф начинается с краткого теоретического введения, приводятся основные определения, методы и способы решения задач. Рассмотрение решения типовых примеров и задач в параграфе, как правило, расположено по возрастающей трудности. Здесь же представлены индивидуальные задания. Для подготовки к защите модуля представлен список контрольных вопросов.

Для выполнения заданий достаточно аккуратно записанных лекций и внимательного изучения методических рекомендаций, предложенных в данном учебном пособии. Кроме того, весь теоретический материал по данным темам хорошо представлен в учебных пособиях, указанных в списке литературы.

Тема 1. Элементы линейной алгебры

Матрицей размера $m \times n$, где m – число строк, n – число столбцов, называется таблица чисел, расположенных в определенном порядке. Сами числа называются **элементами матрицы**.

Матрицы обозначаются большими латинскими буквами: $A, B, C, \dots$. Элементы матрицы обозначаются символом a_{ij} , где i – номер строки, а j – номер столбца, на пересечении которых находится элемент:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Суммой (разностью) двух матриц A и B размера $m \times n$ называется матрица C размера $m \times n$, элементы которой определяются равенствами: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ ($c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$)

Произведением матрицы A на число λ называется матрица C , у которой каждый элемент равен произведению соответствующего элемента матрицы A на число λ .

Произведением матрицы A размера $m \times n$ на матрицу B размера $n \times k$ называется матрица C размера $m \times k$, у которой элемент, стоящий на пересечении i -той строки и j -того столбца равен сумме произведений элементов i -той строки первого сомножителя на элементы j -того столбца второго сомножителя.

Матрица B наз. **транспонированной** к A и обозначается $B = A^t$, если строки матрицы B являются столбцами матрицы A с теми же номерами (а столбцы B – строками A).

Определителем 2-го порядка называется число, вычисляемое по формуле:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

то есть определитель 2-го порядка равен произведению элементов, стоящих на главной диагонали минус произведение элементов, стоящих на побочной диагонали.

Определителем 3-го порядка называется число, вычисляемое по формуле:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

Пусть A – квадратная матрица, тогда квадратная матрица, обозначаемая символом A^{-1} и удовлетворяющая условиям:

$$A \cdot A^{-1} = E, \quad A^{-1} \cdot A = E.$$

называется матрицей, **обратной** матрицы A .

Систему n линейных уравнений с n неизвестными:

[illegible]

Числа a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) называются **коэффициентами** системы, а числа b_j называются **свободными членами**.

Решением системы называется совокупность чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$, при подстановке которых в систему получаем верные равенства.

Система, имеющая решение, называется **совместной**.

Система, не имеющая решение, называется **несовместной**.

Если все свободные члены равны 0, то система называется **однородной**, в противном случае – **неоднородной**.

Методы решения СЛУ – метод Крамера, метод Гаусса, метод обратной матрицы.

Индивидуальные задания

Задание 1. Найти значение выражения $(n-10) \cdot A + B \cdot C$, если n нечетно, и значение выражения $C \cdot B - (n-10) \cdot A$, если n четно.

n	A	B	C
1	$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$
2	$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 8 & -2 & 3 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 6 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 1 & -9 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
5	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
6	$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$
7	$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
8	$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
9	$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 7 & -1 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix}$
10	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -6 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Задание 2. Записать систему линейных уравнений, соответствующую уравнению в матричной форме:

$$A \cdot X = B, \text{ где } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Решить полученную систему методом Крамера, методом обратной матрицы и методом Гаусса

n	A	B	n	A	B
1	$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$	4	$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$
n	A	B	n	A	B
5	$\begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$
7	$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -12 \\ -9 \\ 0 \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ -2 & 8 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$
9	$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$	10	$\begin{pmatrix} -4 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

Тема 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия

Рассмотрим решение практического упражнения.

Задание 1. На плоскости даны точки $A(11;-5)$, $B(6;7)$, $C(-10;-5)$. Найти уравнение биссектрисы угла A .

Решение.

Найдем направляющий вектор $\vec{q}$ биссектрисы как сумму ортов векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$

$$\vec{q} = \frac{1}{|\overrightarrow{AB}|} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{|\overrightarrow{AC}|} \cdot \overrightarrow{AC},$$

или (умножая на $|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|$)

$$\vec{q} = |\overrightarrow{AC}| \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AB}| \cdot \overrightarrow{AC}.$$

Имеем

$$\overrightarrow{AB} = (6 - 11; 7 - (-5)) = (-5; 12); \quad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = 13;$$

$$\overrightarrow{AC} = (-10 - 11; -5 - (-5)) = (-21; 0); \quad |\overrightarrow{AC}| = 21.$$

Тогда

$$\vec{q} = 21 \cdot (-5; 12) + 13 \cdot (-21; 0) = (-378; 252) = 126 \cdot (-3; 2).$$

Таким образом, в качестве направляющего вектора биссектрисы угла A можно взять вектор $\vec{q} = (-3; 2)$ и уравнение биссектрисы будет иметь вид

$$\frac{x - 11}{-3} = \frac{y + 5}{2}.$$

Задание 2. Даны точки $A(-1 - P_7; P_5 - 2)$ и $B(P_5 - 2; P_5 + 4)$. Найти:

а) точку $C(x_1; y_1)$ – середину отрезка AB ;

б) точку $D(x_2; y_2)$, которая делит отрезок AB в отношении $\frac{P_9 + 1}{9 - P_9}$.

Решение.

Пусть $n=101$. Тогда $P_5 = 1$, $P_7 = 3$, $P_9 = 2$. Значит $A(-4; -1)$, $B(-1; 5)$.

$$\text{а) } x_1 = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-4 - 1}{2} = -2,5;$$

$$y_1 = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-1 + 5}{2} = 2. \text{ Получили } C(-2,5;2).$$

$$\text{б) Если } \lambda = \frac{P_9 + 1}{9 - P_9} = \frac{3}{8}, \text{ то } x_2 = \frac{x_A + \lambda \cdot x_B}{1 + \lambda} = \frac{-4 + \frac{3}{8} \cdot (-1)}{1 + \frac{3}{8}} = -\frac{35}{11},$$

$$y_2 = \frac{y_A + \lambda \cdot y_B}{1 + \lambda} = \frac{-1 + \frac{3}{8} \cdot 5}{1 + \frac{3}{8}} = \frac{7}{11}.$$

$$\text{Получили } D\left(-\frac{35}{11}; \frac{7}{8}\right).$$

Задание 3. На плоскости даны точки $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$.

Сделать чертёж треугольника ABC и найти:

а) длину и уравнение стороны BC (записать общее уравнение, каноническое, параметрические и с угловым коэффициентом);

б) косинус угла A и угол A (в градусах);

в) уравнение прямой, проходящей через точку A параллельно стороне BC ;

г) высоту, проведённую к стороне BC и её уравнение;

д) уравнение медианы, проведённой к стороне BC ;

е) уравнение биссектрисы угла A .

Решение.

Даны точки $A(11; -5)$, $B(6; 7)$, $C(-10; -5)$.

а) Каноническое уравнение прямой, проходящей через точки

$B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$ рассчитывается по формуле: $\frac{x - x_2}{x_3 - x_2} = \frac{y - y_2}{y_3 - y_2}$ или

$$\frac{x - x_2}{l} = \frac{y - y_2}{m}.$$

Тогда каноническое уравнение прямой BC будет иметь вид:

$$\frac{x - 6}{-10 - 6} = \frac{y - 7}{-5 - 7}, \text{ или } \frac{x - 6}{-16} = \frac{y - 7}{-12}, \text{ или } \frac{x - 6}{4} = \frac{y - 7}{3}.$$

Общее уравнение прямой: $m \cdot x - l \cdot y + (l \cdot y_2 - m \cdot x_2) = 0$ или $A \cdot x + B \cdot y + C = 0$.

Тогда общее уравнение прямой BC будет иметь вид: $3(x-6)=4(y-7)$, $3x-18=4y-28$, $3x-4y+10=0$.

Параметрические уравнения прямой, проходящей через точку B имеют вид:
$$\begin{cases} x = x_2 + l \cdot t; \\ y = y_2 + m \cdot t. \end{cases}$$

В качестве направляющего вектора берем вектор $\overrightarrow{BC} = (4;3)$ и параметрические уравнения прямой BC будут иметь вид:
$$\begin{cases} x = 6 + 4t; \\ y = 7 + 3t. \end{cases}$$

Уравнение прямой с угловым коэффициентом: $y = -\frac{A \cdot x}{B} - \frac{C}{B}$ или $y = kx + b$.

Тогда уравнение с угловым коэффициентом прямой BC будет иметь вид: $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{2}$.

$$\text{б) } \cos A = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{(x_3 - x_1) \cdot (x_2 - x_1) + (y_3 - y_1) \cdot (y_2 - y_1)}{\sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2} \cdot \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = g.$$

$$A = \arccos(g).$$

$$\overrightarrow{AC} = (-10 - 11; -5 - (-5)) = (-21; 0), \text{ тогда } |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-21)^2 + 0^2} = 21,$$

$$\overrightarrow{AB} = (6 - 11; 7 - (-5)) = (-5; 12), \text{ тогда } |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = 13,$$

$$\cos A = \frac{-21 \cdot (-5) + 0 \cdot 12}{21 \cdot 13} = \frac{5}{13}, \quad A = \arccos \frac{5}{13}.$$

в) 1 способ.

Прямая, параллельная BC имеет такой же угловой коэффициент k , как и BC . Подставим координаты точки A в уравнение с угловым коэффициентом $y = kx + b_1$ и найдем b_1 .

Уравнение с угловым коэффициентом прямой BC , полученное в пункте а) имеет вид: $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{2}$. По условию $A(11; -5)$.

При подстановке координат точки A в уравнение $y = \frac{3}{4}x + b_1$ получим: $-5 = \frac{3}{4} \cdot 11 + b_1$, откуда $b_1 = -\frac{53}{4}$. Таким образом, уравнение искомой прямой примет вид: $y = \frac{3}{4}x - \frac{53}{4}$ или $3x - 4y - 53 = 0$.

2 способ.

Каноническое уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_1; y_1)$ имеют вид $\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m}$, где $(l; m)$ – направляющий вектор прямой. В качестве направляющего вектора прямой направляющего вектора прямой параллельной BC можно взять направляющий вектор прямой BC , вектор $\overrightarrow{BC} = (4; 3)$.

Тогда искомое уравнение примет вид: $\frac{x - 11}{4} = \frac{y - (-5)}{3}$, т.е. $3x - 4y - 53 = 0$.

г) 1 способ.

Уравнение высоты к стороне BC : $y = -\frac{1}{k} \cdot x + b_2$.

b_2 находится подстановкой значений x и y точки A в это уравнение.

При подстановке координат точки A в уравнение $y = -\frac{4}{3}x + b_2$ получим: $-5 = -\frac{4}{3} \cdot 11 + b_2$, откуда $b_2 = \frac{29}{3}$. Таким образом, уравнение искомой прямой примет вид: $y = -\frac{4}{3}x + \frac{29}{3}$ или $4x + 3y - 29 = 0$.

Для нахождения длины высоты, найдём точку пересечения стороны BC и полученной высоты:

$$\begin{cases} 3x - 4y + 10 = 0; \\ 4x + 3y - 29 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12x - 16y + 40 = 0; \\ 12x + 9y - 87 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -25y + 127 = 0; \\ 3x - 4y + 10 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5,08; \\ x = 3,44. \end{cases}$$

Получили точку $A_1(3,44; 5,08)$.

Длина высоты: $h = |\overrightarrow{AA_1}| = \sqrt{(3,44 - 11)^2 + (5,08 - (-5))^2} = 12,6$.

2 способ.

Уравнение прямой, проходящей через точку с координатами (x_1, y_1) перпендикулярно ненулевому вектору $\vec{n} = (A, B)$ имеет вид:

$$A \cdot (x - x_1) + B \cdot (y - y_1) = 0.$$

В качестве нормального вектора высоты, проведенной к стороне ВС можно взять направляющий вектор прямой ВС, например вектор $\overrightarrow{BC} = (4; 3)$.

Тогда уравнение высоты будет иметь вид:

$$4 \cdot (x - 1) + 3 \cdot (y - (-5)) = 0 \text{ или } 4 \cdot x + 3 \cdot y - 29 = 0.$$

Длина высоты – это расстояние от точки А до прямой ВС. Расстояние от точки $A(x_1, y_1)$ до прямой а, имеющей общее уравнение $A \cdot x + B \cdot y + C = 0$ можно найти по формуле:

$$h = d(A, (a)) = \frac{|A \cdot x_1 + B \cdot y_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Общее уравнение прямой ВС имеет вид: $3 \cdot x - 4 \cdot y + 10 = 0$. Поэтому $h = \frac{|3 \cdot 11 - 4 \cdot (-5) + 10|}{\sqrt{3^2 + 4}} = \frac{63}{5} = 12,6$.

д) Если точка M – середина BC , то $x_M = \frac{x_2 + x_3}{2}$; $y_M = \frac{y_2 + y_3}{2}$.

Уравнение медианы: $\frac{x - x_1}{x_M - x_1} = \frac{y - y_1}{y_M - y_1}$.

По условию, $B(6; 7)$, $C(-10; -5)$, тогда $x_M = \frac{6 + (-10)}{2} = -2$, $y_M = \frac{7 + (-5)}{2} = 1$. Значит $M(-2; 1)$.

Уравнение медианы, проведенной к стороне ВС:

$$\frac{x - 11}{-2 - 11} = \frac{y - (-5)}{1 - (-5)} \text{ или } \frac{x - 11}{-13} = \frac{y + 5}{6}.$$

е) По свойству биссектрисы угла: $\frac{A_2 B}{A_2 C} = \frac{AB}{AC}$.




Рисунок. Вспомогательный чертёж к заданию 3

Пусть $\frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AC}|} = \lambda$, тогда координаты точки A_2 находятся по формулам: $x_{A_2} = \frac{x_2 + \lambda \cdot x_3}{1 + \lambda}$; $y_{A_2} = \frac{y_2 + \lambda \cdot y_3}{1 + \lambda}$, где $B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$.

Из пункта б) мы имеем: $|\overrightarrow{AC}| = 21$, $|\overrightarrow{AB}| = 13$, значит $\lambda = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AC}|} = \frac{13}{21}$,

$$\text{тогда } x_{A_2} = \frac{6 + \frac{13}{21} \cdot (-10)}{1 + \frac{13}{21}} = -\frac{2}{17}, \quad y_{A_2} = \frac{7 + \frac{13}{21} \cdot (-5)}{1 + \frac{13}{21}} = \frac{41}{17}.$$

Искомое уравнение биссектрисы мы находим как уравнение прямой, проходящей через точки $A(11; -5)$ и $A_2\left(-\frac{2}{17}; \frac{41}{17}\right)$.

$$\frac{x - 11}{-\frac{2}{17} - 11} = \frac{y - (-5)}{\frac{41}{17} - (-5)} \quad \text{или} \quad \frac{x - 11}{-\frac{189}{17}} = \frac{y + 5}{\frac{126}{17}} \quad \text{или} \quad \frac{x - 11}{-3} = \frac{y + 5}{2}.$$

Задание 4. Дана точка $(0; 2)$ пересечения медиан треугольника и уравнения двух его сторон $5x - 4y + 15 = 0$ и $4x + y - 9 = 0$. Найти координаты вершин треугольника и уравнение третьей стороны.

Решение.

Координаты одной вершины найдем как координаты точки пересечения данных сторон, для чего решим систему уравнений

$$\begin{cases} 5x - 4y + 15 = 0, \\ 4x + y - 9 = 0. \end{cases}$$

Получаем $\begin{cases} y=9-4x, \\ 5x-4(9-4x)+15=0, \end{cases}$ или $\begin{cases} x=1, \\ y=5. \end{cases}$

Точка O пересечения медиан треугольника называется его центром. Отметим одно свойство центра треугольника, которое используем для нахождения координат остальных вершин:

$$x_{\text{ц}} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y_{\text{ц}} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3},$$

где $x_{\text{ц}}, y_{\text{ц}}$ - координаты центра треугольника;

x_i, y_i - координаты i -ой вершины треугольника, $i = 1, 2, 3$.

Для доказательства этих формул рассмотрим треугольник $A_1A_2A_3$, где $A(x_i; y_i)$, $i = 1, 2, 3$ (см. рис.)




Рисунок. Вспомогательный чертеж к заданию 4

Пусть B – середина стороны A_1A_2 . Тогда A_3B – медиана треугольника $A_1A_2A_3$. По известному из элементарной геометрии свойству медиан треугольника $A_3O_{\text{ц}} = 2 \cdot BO_{\text{ц}}$. Тогда координаты точки B найдем по формулам:

$$x_B = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{и} \quad y_B = \frac{y_1 + y_2}{2},$$

а координаты центра $O_{\text{ц}}$ из векторного соотношения $\overrightarrow{O_{\text{ц}}A_3} = 2 \cdot \overrightarrow{BO_{\text{ц}}}$, которое в координатной форме записывается так:

$$x_3 - x_{\text{ц}} = 2 \cdot \left(x_{\text{ц}} - \frac{x_1 + x_2}{2}\right), \quad y_3 - y_{\text{ц}} = 2 \cdot \left(y_{\text{ц}} - \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

Отсюда, выражая $x_{\text{ц}}$ и $y_{\text{ц}}$ через x_i, y_i , получим требуемые формулы.

Используя доказанные формулы, полагая в них $x_1 = 1$ и $y_1 = 5$, $x_{Ц} = 0$ и $y_{Ц} = 2$, получим два уравнения, которым должны удовлетворять координаты остальных двух вершин

$$0 = \frac{1 + x_2 + x_3}{3}, \quad 2 = \frac{5 + y_2 + y_3}{3}, \text{ откуда}$$

$$x_2 + x_3 = -1, \quad y_2 + y_3 = 1.$$

Еще два уравнения получим если потребуем, чтобы искомые точки, вершины треугольника, принадлежали заданным сторонам, т.е. их координаты удовлетворяли уравнениям этих сторон

$$5x - 4y + 15 = 0, \quad 4x + y - 9 = 0.$$

Итак, для определения четырех неизвестных x_2, x_3, y_2, y_3 , мы имеем четыре независимых условия:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = -1, \\ y_2 + y_3 = 1, \\ 5x_2 - 4y_2 + 15 = 0, \\ 4x_3 + y_3 - 9 = 0. \end{cases}$$

Решив эту систему уравнений, получим $x_2 = -3$, $y_2 = 0$, $x_3 = 2$, $y_3 = 1$.

Уравнение третьей стороны запишем как уравнение прямой, проходящей через две заданные точки $(-3;0)$ и $(2;1)$

$$\frac{x - (-3)}{2 - (-3)} = \frac{y - 0}{1 - 0} \text{ или } \frac{x + 3}{5} = y.$$

Итак, уравнение третьей стороны $x - 5y + 3 = 0$, а вершины треугольника имеют координаты $(1;5)$, $(-3;0)$, $(2;1)$.

Индивидуальные задания

Задание 1

На плоскости даны точки $A(\alpha_1; \alpha_2 - 2)$ и $B(\alpha_2 - 2; \alpha_2 + 4)$

Найти:

а) точку $C(x_1; y_1)$ – середину отрезка AB ;

б) точку $D(x_2; y_2)$, которая делит отрезок AB в отношении $p : q$.

Параметры p, q приведены в табл.1.

Таблица 1

Параметры p, q к заданию 1

$n(\text{mod } 10)$	p	q	$n(\text{mod } 10)$	p	q
1	1	3	6	3	2
2	3	1	7	3	7
3	1	4	8	7	3
4	4	1	9	1	9
5	2	3	0	9	1

Задание 2

Даны точки $A(-1 - P_7; P_5 - 2)$ и $B(P_5 - 2; P_5 + 4)$. Найти:

а) точку $C(x_1; y_1)$ – середину отрезка AB ;

б) точку $D(x_2; y_2)$, которая делит отрезок AB в отношении $(P_9 + 1) : (9 - P_9)$.

Задание 3

На плоскости даны точки $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$. Координаты точек взять в таблицы 2.

Сделайте чертёж треугольника ABC и найдите:

а) длину и уравнение стороны BC (записать общее уравнение, каноническое, параметрические и с угловым коэффициентом);

б) косинус угла A и угол A (в градусах);

в) уравнение прямой, проходящей через точку A параллельно стороне BC ;

г) высоту, проведенную к стороне BC , и её уравнение;

д) уравнение медианы, проведенной к стороне BC ;

е) уравнение биссектрисы угла A .

Таблица 2

Координаты точек А, В, С к заданию 9

n	x ₁	y ₁	x ₂	y ₂	x ₃	y ₃
1	2	3	4	5	6	7
1	14	-1	-1	7	-7	-1
2	-1	-1	2	-1	2	3
3	-7	-2	7	-2	2	10
4	-1	-1	4	1	-5	-1
5	-5	-2	3	13	-5	7
6	-1	6	-1	-2	5	-2
7	8	-6	8	1	-4	10
8	-5	-6	11	6	0	6
9	-2	1	2	-2	6	1
10	-3	-11	5	4	-3	10
11	5	-7	5	7	-7	2
12	9	-4	-3	5	-3	1
13	8	7	-1	7	-7	-1
14	15	9	8	9	-1	-3
15	1	-9	1	2	-11	7
16	4	2	-5	14	-14	2
17	-3	-1	12	7	-9	7
18	9	9	-5	9	0	-3
19	-9	3	-9	-5	6	-5
20	-7	-3	-7	1	5	6
21	6	-6	-2	9	-2	0
22	-2	8	3	-4	8	8
23	-1	-1	8	11	-8	-1
24	-7	12	-7	1	5	-4
25	1	3	7	3	4	7
26	-6	13	-14	7	-6	-8
27	2	10	-7	-2	7	-2
28	-5	-1	-1	-1	4	11
29	-5	12	7	-4	7	12
30	8	-3	14	5	-1	-3

Контрольные вопросы

1. Общее уравнение прямой на плоскости. Нормальный вектор прямой. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности.
2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности.
3. Каноническое и параметрическое уравнения прямой на плоскости. Направляющий вектор прямой. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности.
4. Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.
5. Уравнения прямых, проходящих через данную точку параллельно и перпендикулярно данной прямой (3 случая задания данной прямой: общим уравнением, каноническим уравнением, уравнением с угловым коэффициентом).
6. Общее уравнение плоскости в пространстве, нормальный вектор плоскости. Угол между плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности.
7. Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки, не лежащие на одной прямой.
8. Общее, каноническое и параметрическое уравнения прямой в пространстве. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности.
9. Угол между прямой и плоскостью в пространстве. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости.
10. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку, перпендикулярно данной прямой. Уравнение прямой, проходящей через данную точку, перпендикулярно данной плоскости.

Тема 3. Элементы функционального анализа

Определение 1. Число A называется *пределом функции* $f(x)$ в точке a , если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое число $\delta > 0$, что из неравенства $0 < |x - a| < \delta$ следует неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Определение 2. Число A называется *правым (левым) пределом* функции $f(x)$ в точке a , если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такое число $\delta > 0$, что из неравенства $a < x < a + \delta$ ($a - \delta < x < a$) следует неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Для обозначения правого (левого) предела функции $f(x)$ в точке a используют следующую символику:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = B \quad (\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = B).$$

При вычислении пределов необходимо помнить их свойства:

если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, то

$$1. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A + B,$$

т.е. предел суммы равен сумме пределов.

Замечание: Если $A = +\infty$, $B = -\infty$, то это свойство не верно и имеем неопределенность $[\infty - \infty]$.

$$2. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \cdot B,$$

т.е. предел произведения равен произведению пределов.

Замечание: Если $A = \infty$, $B = 0$, то это свойство не верно и имеем неопределенность $[\infty \cdot 0]$.

Если $f(x) = C$, где $C = \text{const}$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} (C \cdot g(x)) = C \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

т.е. постоянный множитель можно выносить за знак предела.

$$3. \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0),$$

т.е. предел частного есть частное пределов.

Замечание: Если $A = \infty$, $B = \infty$ или $A = 0$, $B = 0$, то это свойство не верно и имеем неопределенность $[\frac{\infty}{\infty}]$ или $[\frac{0}{0}]$.

$$4. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = A^B.$$

Замечание: Если $A = 1, B = \infty$, или $A = 0, B = 0$, или $A = \infty, B = 0$, то это свойство не верно и имеем неопределенность $[1^\infty]$, или $[0^0]$, или $[\infty^0]$.

Первый замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \text{ неопределенность } \left[\frac{0}{0} \right].$$

Следствия:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1,$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1,$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{tg} x} = 1,$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1,$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arcsin x} = 1,$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1,$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{arctg} x} = 1,$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Второй замечательный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e, \text{ неопределенность } [1^\infty], e \approx 2,7.$$

Следствия:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e,$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e,$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a (1 + x)}{x} = \log_a e,$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1,$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a,$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^m - 1}{x} = m.$$

Замечание: Если $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$,
 $P_m(x) = b_m x^m + b_{m-1} \cdot x^{m-1} + \dots + b_1 \cdot x + b_0$, причем $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$,
 тогда при вычислении предела вида $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{P_m(x)}$ можно выделить 3 случая.

1 случай: степень многочлена числителя меньше степени многочлена знаменателя ($n < m$), то такой предел равен 0;

2 случай: степень многочлена числителя больше степени многочлена знаменателя ($n > m$), то такой предел равен ∞ ;

3 случай: степени многочленов числителя и знаменателя равны ($n=m$), то такой предел равен отношению коэффициентов при старших степенях, т.е. равен $\frac{a_n}{b_m}$.

Пример 1. Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 4}{3x + 8} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$.

Способ 1. Разделив числитель и знаменатель на x^2 , имеем

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2} + \frac{4}{x^2}}{\frac{3x}{x^2} + \frac{8}{x^2}} = \left[\frac{1 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0}{3 \cdot 0 + 8 \cdot 0} \right] = \infty$$

Способ 2. Используя замечание (случай 2) вычисление предела можно заменить вычислением эквивалентного ему предела

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 4}{3x + 8} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3} = \infty.$$

Пример 2. Найти $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x}{(\arctg 2x)^2}$.

Решение. Так как $\sin x \sim x$, а $\arctg 2x \sim 2x$ при $x \rightarrow 0$, то

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x}{(\arctg 2x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{(2x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{4x^2} = \frac{1}{4}.$$

Пример 3. Найти $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} \right)^{1+2x}$.

Решение. Здесь $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot \sin 3x}{3x} = 3$ и $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x) = 1$,

следовательно, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} \right)^{1+2x} = 3^1 = 3$.

Пример 4. Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2}{3x^2 + 1} \right)^{x^2}$.

Решение. Имеем $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{3x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x^2}}{3 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{3}$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = +\infty$

Поэтому $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2}{3x^2 + 1} \right)^{x^2} = \left[\left(\frac{1}{3} \right)^{+\infty} \right] = 0$.

Примеры 5. Найти $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) = [\infty - \infty]$.

Преобразуем выражение в скобках

$$\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} = \frac{1 \cdot (1+x+x^2) - 3}{1-x^3} = \frac{x^2 + x - 2}{1-x^3}.$$

Разложим числитель и знаменатель на множители:

$$x^2 + x - 2 = 0,$$

$$D = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9, \quad x_1 = \frac{-1+3}{2} = 1; \quad x_2 = \frac{-1-3}{2} = -2,$$

$$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2),$$

$$1-x^3 = (1-x)(1+x+x^2).$$

Выражение в скобках примет вид

$$\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} = \frac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(1+x+x^2)} = \frac{(x-1)(x+2)}{-(x-1)(1+x+x^2)} = -\frac{x+2}{1+x+x^2}.$$

тогда

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{x+2}{1+x+x^2} \right) = -\frac{1+2}{1+1+1} = -\frac{3}{3} = -1.$$

Индивидуальные задания

Задание 1. Вычислить предел функции, числовой последовательности, раскрыв неопределенность типа $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Задания взять из таблицы 1.

Таблица 1

№№ nn	Задание	№№ nn	Задание
1	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2x - x^3}{3x - 2x^2 + x^4}$	2	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5x}{x^3 + 4x + 4}$
3	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x^2 - 5}{x^3 + x - 2}$	4	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 5x^2 + 3x^5}{x^5 + 6x + 8}$
5	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 6x - 5}{5x^2 - x - 1}$	6	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 7x + 3}{3x^3 - x - 4}$
7	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2 + 5x^4}{2 + 3x^2 + x^4}$	8	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^3 - 6x^2 + 12}{x^3 + 4x}$
9	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - 2x^3 + 2}{x^4 + 3}$	10	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5x + 1}{3x + 7}$
11	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 12x + 6}{3x^2 - 2x}$	12	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{16x^3 + 7x^2 + 5x}{12x^3 + 4x}$
13	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 5}{x^3 + 2}$	14	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - 1}{x^2 - 3x + 6}$
15	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 9}{2x^2 - x + 4}$	16	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - 2x^2 + 4}{2x^4 + 3x^2 + 1}$
17	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 5x^2 + 2}{2x^3 + 5x^2 - x}$	18	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + x^2 - 6}{2x^2 + 3x + 1}$
19	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 10x + 3}{2x^2 + 5x - 3}$	20	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5x + 7}{2x^2 - x + 10}$

Задание 2. Вычислить предел функции, раскрыв неопределенность типа $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. Задания взять из таблицы 2

Таблица 2

№ nn	Задание	№ nn	Задание
1	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 2x^2}{5x^3 - 4x^2}$	2	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^2 + x^3}$
3	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9}$	4	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{2x+6}}{x^2 - 5x}$
5	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 8x + 4}{5x^2 - 14x + 8}$	6	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{\sqrt{x^2 + 16} - 4}$
7	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(1+x)^3} - 1}{x}$	8	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2}$
9	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - x}$	10	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$
11	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$	12	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$
13	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$	14	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}$
15	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3 + x}{x}$	16	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x}{x^4 + 2x^2 - 3}$
17	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - x - 2}{x^3 - x^2 + 4x - 4}$	18	$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + x - 15}{3x^2 + 7x - 6}$
19	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+3x} - 1}$	20	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

Задание 3. Вычислить предел функции, используя I и II замечательные пределы и их вариации. Задания взять из таблицы 3.

Таблица 3

№№ nn	Задание	№№ nn	Задание
1	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{3x}$	2	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{5x^3}{2x+1}}$
3	$\lim_{x \rightarrow -\pi/2} \frac{\cos^2 x}{1 + \sin^3 x}$	4	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 3}\right)^{x^3 - 5}$
5	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x}$	6	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 3}\right)^{x^3 - 5}$
7	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{2x}$	8	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 \sqrt{x})^{\frac{1}{2x}}$
9	$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{\operatorname{tg} x - 1}$	10	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{2x^2 - 1}{x+1}}$
11	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2}\right)^{2x+1}$	12	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x \operatorname{tg} 2x}$
13	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{x^2}$	14	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+4}\right)^{x^2+5}$
15	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-4}{2x+1}\right)^{3x+5}$	16	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + \sin x}{x}$
17	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x^2}$	18	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}\right)^{x^2}$
19	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1}\right)^{2x+3}$	20	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+8}{x-2}\right)^x$

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте определения предела функции в точке, предела функции в бесконечности, предела последовательности.
2. Как связано понятие предела функции с понятиями ее пределов слева и справа?
3. Какая функция называется бесконечно малой и каковы ее основные свойства?
4. Какая функция называется бесконечно большой и какова ее связь с бесконечно малой?
5. Сформулируйте основные теоремы о пределах функций.
6. Как раскрываются неопределенности видов
 $\left[\frac{\infty}{\infty}\right], \left[\frac{0}{0}\right], [\infty - \infty], [0 \infty]$.
7. Сформулируйте первый замечательный предел и его следствия.
8. Сформулируйте второй замечательный предел.

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 .

Определение. Предел отношения приращения Δy функции в этой точке (если он существует) к приращению Δx аргумента, когда $\Delta x \rightarrow 0$, называется производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Обозначения: $f'(x_0)$ или $y'(x_0)$ или $\frac{df(x_0)}{dx}$ или $f' \Big|_{x=x_0}$.

Таким образом,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Вычисление производной называется дифференцированием функции.

Так как дифференцирование функций с использованием только таблицы производных элементарных функций и основных правил дифференцирования не вызывает особых затруднений, то мы остановимся лишь на приемах вычисления производных сложных функций.

Производная сложной функции

Рассмотрим некоторую сложную функцию $y = f[\varphi(x)]$.

В этой цепи функциональных зависимостей $y = f(z)$ и $z = \varphi(x)$ аргумент x является последним и поэтому его называют **независимой переменной**. Таким образом, понятие аргумента и независимой переменной следует различать. Например, пусть $y = \sqrt{z}$ и $z = \cos x$. Здесь z есть аргумент функции y , но z , не будет независимой переменной. В результате, производная сложной функции $y = f[\varphi(z)]$ равна производной данной функции y по промежуточному аргументу z , умноженной на производную самого промежуточного аргумента z по независимой переменной x , т.е.

$$y'_x = y'_z \cdot y'_x.$$

Пример 1. Найти производную от функции $y = \ln^3 x$.

Решение. Полагаем $z = \ln x$, тогда $y = z^3$. Отсюда $y'_z = 3z^2 = 3 \cdot \ln^2 x$, $z'_x = \frac{1}{x}$. Следовательно, $y'_x = 3 \ln^2 x \cdot \frac{1}{x}$.

При достаточном навыке промежуточную переменную z не пишут, вводя ее лишь мысленно.

Пример 2. Найти производную от функции $y = \sin(x^3 - 3x^2 + 5)$.

Решение.

$$\begin{aligned} y' &= \cos(x^3 - 3x^2 + 5) \cdot (x^3 - 3x^2 + 5)' = \\ &= (3x^2 - 6x) \cos(x^3 - 3x^2 + 5) = 3x(x - 2) \cos(x^3 - 3x^2 + 5). \end{aligned}$$

Пример 3. Найти производную от функции $y = e^{\sqrt{x^2 + x - 1}}$.

Решение.

$$\begin{aligned} y' &= e^{\sqrt{x^2 + x - 1}} \cdot (\sqrt{x^2 + x - 1})' = \frac{e^{\sqrt{x^2 + x - 1}}}{2\sqrt{x^2 + x - 1}} \cdot (x^2 + x - 1)' = \\ &= \frac{(2x + 1) \cdot e^{\sqrt{x^2 + x - 1}}}{2\sqrt{x^2 + x - 1}}. \end{aligned}$$

Производная функции, заданной в неявном виде

В некоторых случаях функция определяется уравнением, которое нельзя элементарными средствами разрешить относительно y , и приходится рассматривать y как неявную функцию от x . В таком варианте существует особый способ нахождения производной. Известно, если две функции тождественно равны друг другу, то равны и их производные. Поэтому, взяв производные от левой и правой частей данного тождества и применяя правило дифференцирования сложной функции (полагая, что y — сложная функция, зависящая от x), получаем равенство, откуда и выражаем y' .

Пример 4. Найти производную от функции, определяемой уравнением $x^4 + y^4 - 4xy = 0$.

Решение. $(x^4 + y^4 - 4xy)' = 0'$,

$$4x^3 + 4y^3 \cdot y' - 4(x'y + xy') = 0$$

$$4x^3 + 4y^3 \cdot y' - 4y - 4xy' = 0$$

$$4y^3 \cdot y' - 4xy' = 4y - 4x^3$$

$$y'(4y^3 - 4x) = 4y - 4x^3$$

$$y' = \frac{4y - 4x^3}{4y^3 - 4x} \quad \text{или} \quad y' = \frac{y - x^3}{y^3 - x}.$$

Производная функции, заданной параметрически

Пусть функция $y = f(x)$ определена параметрически: $x = x(t)$, $y = y(t)$. Тогда, если функции $x(t)$ и $y(t)$ имеют производные в точке t_0 , причем $x'(t_0) \neq 0$, а функция $y = f(x)$ имеет производную в точке $x_0 = x(t_0)$, то эта производная находится по формуле

$$y'(x_0) = \frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)} \quad \text{или} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

Пример 5. Найти $y'(x)$ для заданной параметрически функции

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}.$$

Решение.

$$x'_t = (t - \sin t)'_t = 1 - \cos t$$

$$y'_t = (1 - \cos t)'_t = \sin t$$

$$y'_t = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \frac{\cos \frac{t}{2}}{\sin \frac{t}{2}} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2}.$$

Логарифмическое дифференцирование

Если дана сложная функция, представляющая собой произведение или частное нескольких функций, причем числитель и знаменатель дроби в свою очередь содержат произведения, то следует обе части данного выражения сначала прологарифмировать по основанию y , применить соответствующие свойства логарифмов, а затем приступить к дифференцированию обеих частей. Этот прием носит название логарифмического дифференцирования. Его также используют, если функция содержит корни из дробей. К этому приему при-

бегают, если имеется показательно-степенная функция или функция вида $y = [f(x)]^{\varphi(x)}$.

Пример 6. Найти производную функции $y = \frac{\sqrt[3]{x^2 + x - 2} \cdot (x^2 + 1)}{\sqrt[5]{x^4 - 1}}$.

Решение. Логарифмируем обе части равенства по основанию e

$$\ln y = \ln \frac{\sqrt[3]{x^2 + x - 2} \cdot (x^2 + 1)}{\sqrt[5]{x^4 - 1}}.$$

Применяя свойства логарифмов, получаем

$$\ln y = \frac{1}{3} \ln(x^2 + x - 2) + \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{5} \ln(x^4 - 1).$$

Дифференцируем обе части, считая y сложной функцией переменной x :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{2x+1}{x^2+x-2} + \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1}{5} \cdot \frac{4x^3}{x^4-1}$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{2x+1}{(x+2)(x-1)} + \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1}{5} \cdot \frac{4x^3}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{5(2x+1)(x+1)(x^2+1) + 30x(x^2-1)(x+2) - 12x^3(x+2)}{15(x-1)(x+1)(x^2+1)(x+2)}$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{10x^4 + 15x^3 + 15x^2 + 15x + 5 + 30x^4 + 60x^3 - 30x^2 - 60x - 12x^4 - 24x^3}{15(x-1)(x+1)(x^2+1)(x+2)}$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{28x^4 + 51x^3 - 15x^2 - 45x + 5}{15(x^2-1)(x^2+1)(x+2)}$$

$$y' = \frac{\sqrt[3]{x^2 + x - 2} \cdot (x^2 + 1)}{\sqrt[5]{x^4 - 1}} \cdot \frac{28x^4 + 51x^3 - 15x^2 - 45x + 5}{15(x^2-1)(x^2+1)(x+2)}$$

$$y' = \frac{28x^4 + 51x^3 - 15x^2 - 45x + 5}{15(x^2-1)(x+2)} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2 + x - 2}}{\sqrt[5]{x^4 - 1}}.$$

Пример 7. Найти производную функции $y = (x^2 - x + 2)^{e^{x+1}}$.

Решение. Логарифмируем обе части по основанию e

$$\ln y = \ln(x^2 - x + 2)^{e^{x+1}}.$$

Используя свойство логарифма, получаем,

$$\ln y = e^{x+1} \ln(x^2 - x + 2).$$

Дифференцируем обе части, считая y сложной функцией переменной x

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot y' &= (e^{x+1})' \ln(x^2 - x + 2) + e^{x+1} \cdot [\ln(x^2 - x + 2)]' \\ \frac{1}{y} \cdot y' &= e^{x+1} \ln(x^2 - x + 2) + e^{x+1} \cdot \frac{1}{x^2 - x + 2} \cdot (2x - 1) \\ y' &= (x^2 - x + 2)^{e^{x+1}} \cdot e^{x+1} \left[\ln(x^2 - x + 2) + \frac{2x - 1}{x^2 - x + 2} \right]. \end{aligned}$$

Замечание. При дифференцировании степенно-показательной функции можно пользоваться формулой

$$(f(x)^{\varphi(x)})' = \varphi(x) \cdot f(x)^{\varphi(x)-1} \cdot f'(x) + f(x)^{\varphi(x)} \cdot \ln f(x) \varphi'(x),$$

если $f(x)$ и $\varphi(x)$ – дифференцируемые функции.

Индивидуальные задания

Задание 1. Найти производную функции первого и второго порядка. Задания взять из таблицы 1.

Таблица 1

№ nn	Задание	№n	Задание
1	$y = x + \ln \frac{x-1}{x+1}$	2	$y = 2\sqrt{x+1} \arcsin x + 4\sqrt{1-x}$
3	$y = x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2\operatorname{arctg} x$	4	$y = x^2 \sqrt{1+x^2} - \frac{2}{3} \sqrt{(1+x^2)^3}$
5	$y = x \operatorname{arctg} \sqrt{x} - \sqrt{x} + \operatorname{arctg} \sqrt{x}$	6	$y = x^3 \ln x - x^2$
7	$y = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x}{\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x}$	8	$y = \frac{\sqrt{1-x^2} + 1}{\sqrt{1-x^2} - 1}$
9	$y = \frac{\sqrt{x^3 + 3x}}{x+1}$	10	$y = \frac{\cos x}{1 + \ln \cos x}$
11	$y = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$	12	$y = \frac{x - \sqrt{1-x^2}}{x^2}$
13	$y = \ln \frac{x}{1 + \sqrt{x^2 + 1}}$	14	$y = \frac{x \ln x + 1}{x \ln x - 1}$
15	$y = \frac{\sqrt{x^3 + 3x}}{x+1}$	16	$y = \frac{\cos x}{\sin^2 x} + \operatorname{ctg}^2 x$
17	$y = \sqrt{1+2x-x^2} + \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{2}}$	18	$y = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 \sqrt{x} + \ln \cos \sqrt{x}$
19	$y = \sqrt{x} - \sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x}$	20	$y = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2 - 1} + \ln(x^2 - 1)$

Задание 2.

Найти производную неявно заданной функции. Задания взять из таблицы 2.

Таблица 2

№№ nn	Задание	№№ nn	Задание
1	$y^2 + xy + x^2 = 1$	2	$x - \cos^2 y - \ln \cos x = 0$
3	$x^3 + 2xy - y^3 = 0$	4	$x - \sin y \cdot e^{\cos x} = 0$
5	$x^2 - xy + y^2 = 1$	6	$y = \ln \cos x - y^2$
7	$y \ln y - xe^y = 1$	8	$x \sin y - y \sin x = 0$
9	$x = 1 - ye^{xy}$	10	$y \cos x + x \sin y = x + y$
11	$y = x + \operatorname{arctg} y$	12	$y \cos x + x \cos y = 0$
13	$y = \sin(x + y)$	14	$e^x - e^y = e^{x+y}$
15	$x + y = \arcsin x + \arccos y$	16	$x \cos y - \sin y + \sin 2y = 0$
17	$3^x + 3^y = 3^{x+y}$	18	$x + y + e^y \operatorname{arctg} x = 0$
19	$x^3 + y^3 = xy$	20	$\ln x = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$

Задание 3. Используя логарифмическое дифференцирование, найти производную функции. Задания взять из таблицы 3.

Таблица 3

№№ nn	Задание	№№ nn	Задание
1	$y = (x^2 + 2x)^{\sqrt{x}}$	2	$y = (\sqrt{x})^x$
3	$y = (\sqrt{x^2 - 1})^{x^3 - 3}$	4	$y = (\operatorname{arctg} e^x)^{e^{-x}}$
5	$y = (\sin x)^{\frac{1}{x}}$	6	$y = (\sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$
7	$y = (\cos x)^{\sqrt{x}}$	8	$y = (x^2 + 1)^{\cos x}$

9	$y = (\ln x)^{\sqrt{x}}$	10	$y = (\cos x)^{\sin x}$
11	$y = (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^{\sqrt{x}}$	12	$y = (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{ctg} x}$
13	$y = (\sin x)^{\arcsin x}$	14	$y = (x + 1)^{\ln x}$
15	$y = (\cos x)^{\arccos x}$	16	$y = (\ln x)^{x^2 - 2}$
17	$y = (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{arctg} x}$	18	$y = (\log_2 x)^{2^x}$
19	$y = (\operatorname{arcctg} x)^{1+x^2}$	20	$y = (3^x)^{\log_3 2}$

Задание 4

Найти производную функции, заданной параметрически. Задания взять из таблицы 4.

Таблица 4

№№ nn	Задание	№№ nn	Задание
1	$\begin{cases} x = \sqrt{t+1} \\ y = \sqrt[3]{t} \end{cases}$	2	$\begin{cases} x = 2^{-t} \\ y = 2^{2t} \end{cases}$
3	$\begin{cases} x = 4t + 1 \\ y = t^2 \end{cases}$	4	$\begin{cases} x = \ln(t+1) \\ y = \frac{1}{t+1} \end{cases}$
5	$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = t^3 \end{cases}$	6	$\begin{cases} x = 3t + 6t^2 \\ y = t^2 + 3t^3 \end{cases}$
7	$\begin{cases} x = \frac{1}{t} \\ y = t^3 + t^2 + t \end{cases}$	8	$\begin{cases} x = \frac{2t}{1+t^2} \\ y = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{cases}$
9	$\begin{cases} x = \sin^2 t \\ y = \cos^2 t \end{cases}$	10	$\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$

11	$\begin{cases} x = \arcsin \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \\ y = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \end{cases}$	12	$\begin{cases} x = \frac{\ln t}{t} \\ y = t \ln t \end{cases}$
13	$\begin{cases} x = \sin t - t \cos t \\ y = \cos t + t \sin t \end{cases}$	14	$\begin{cases} x = t + \cos t \\ y = 1 + \cos t \end{cases}$
15	$\begin{cases} x = e^t \\ y = e^{2t} \end{cases}$	16	$\begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$
17	$\begin{cases} x = t + \cos t \\ y = 1 + \cos t \end{cases}$	18	$\begin{cases} x = \operatorname{arctgt} \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$
19	$\begin{cases} x = t + \ln t \\ y = t - \ln t \end{cases}$	20	$\begin{cases} x = \operatorname{tgt} \\ y = \operatorname{ctgt} \end{cases}$

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте определения предела функции в точке, предела функции в бесконечности, предела последовательности.
2. Как связано понятие предела функции с понятиями ее пределов слева и справа?
3. Какая функция называется бесконечно малой и каковы ее основные свойства?
4. Сформулируйте определение производной.
5. Каков ее механический и геометрический смысл?
6. Сформулируйте основные правила дифференцирования функций.
7. В чем заключается суть логарифмического дифференцирования и в каких случаях его целесообразно применять?
8. Каково правило дифференцирования функции, заданной неявно?
9. Как находится первая производная функции, заданной параметрически?

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной

Интегрирование представляет собой операцию обратную дифференцированию, поэтому каждой формуле дифференцирования соответствует формула интегрирования. Это дает возможность написать таблицу основных интегралов

1. $\int dx = x + C;$
2. $\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1);$
3. $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C;$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$
5. $\int e^x dx = e^x + C;$
6. $\int \cos x dx = \sin x + C;$
7. $\int \sin x dx = -\cos x + C;$
8. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$
9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$
10. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$
11. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$
12. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$
13. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C;$
14. $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C;$
15. $\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C;$
16. $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C;$
17. $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C;$
18. $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C = \ln \left| \frac{1}{\sin x} - \operatorname{ctg} x \right| + C;$
19. $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C = \ln \left| \operatorname{tg} x + \frac{1}{\cos x} \right| + C.$

Укажем ряд приемов, позволяющих во многих случаях сводить заданные интегралы к табличным.

Примеры выполнения задания 1

Пример 1. Найти интегралы (используя метод разложения), результаты проверить дифференцированием:

$$\text{а) } \int \frac{\sqrt{x^3} - 8}{\sqrt{x} - 2} dx;$$

$$\text{б) } \int \frac{2 \cos^2 x + 3 \sin^2 x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx;$$

Решение. Нахождение каждого из интегралов начинается с преобразования подынтегральной функции. В задаче а) воспользуемся формулой сокращенного умножения и затем почленным делением числителя на знаменатель

$$\begin{aligned} \text{а) } \int \frac{\sqrt{x^3} - 8}{\sqrt{x} - 2} dx &= \int \frac{(\sqrt{x})^3 - 2^3}{\sqrt{x} - 2} dx = \int \frac{(\sqrt{x} - 2)(x + 2\sqrt{x} + 4)}{\sqrt{x} - 2} dx = \\ &= \int (x + 2\sqrt{x} + 4) dx = \int x dx + 2 \int x^{1/2} dx + 4 \int dx = \\ &= \frac{1}{2} x^2 + 2 \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} + 4 \cdot x + C = \frac{1}{2} x^2 + \frac{4}{3} \cdot \sqrt{x^3} + 4x + C. \end{aligned}$$

(см. табличные интегралы 1 и 2). Обращаем внимание на то, что в конце решения записываем одну общую постоянную C , не записывая постоянные от интегрирования отдельных слагаемых.

$$\begin{aligned} \text{б) } \int \frac{2 \cos^2 x + 3 \sin^2 x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx &= \int \left(\frac{2 \cos^2 x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} + \frac{3 \sin^2 x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} \right) dx = \\ &= \int \left(\frac{2}{\sin^2 x} + \frac{3}{\cos^2 x} \right) dx = 2 \int \frac{dx}{\sin^2 x} + 3 \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \\ &= 2 \cdot (-\operatorname{ctgx}) + 3 \cdot \operatorname{tgx} + C = 3 \cdot \operatorname{tgx} - 2 \cdot \operatorname{ctgx} + C. \end{aligned}$$

(см. табличные интегралы 8 и 9).

Замечание. Проверку полученных результатов дифференцированием предлагаем студентам выполнить самостоятельно.

Одним из основных методов интегрирования является метод замены переменной (или метод подстановки), описываемый следующей формулой:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt,$$

где $x = \varphi(t)$ – функция, дифференцируемая на рассматриваемом промежутке. Данная формула показывает, что переходя к новой пе-

ременной, достаточно выполнить замену в подынтегральном выражении. Удачная замена позволяет упростить исходный интеграл, а в простейших случаях свести его к табличному (табличным).

Отметим два частных случая замены переменных:

1. Введение под дифференциал постоянного слагаемого.

Для любой постоянной величины a справедливо равенство:

$$d(x + a) = dx,$$

$$\text{поэтому } \int f(x)dx = \int f(x)d(x + a).$$

2. Введение под дифференциал постоянного множителя.

Так как $d(a \cdot x) = a \cdot dx$, то имеет место равенство

$$dx = \frac{1}{a} \cdot d(a \cdot x), \quad (a \neq 0)$$

$$\text{поэтому } \int f(x)dx = \frac{1}{a} \cdot \int f(x)d(a \cdot x).$$

Пример 2. Найти интегралы:

$$\text{а) } \int \sin(7x + 2)dx; \quad \text{б) } \int \sqrt[3]{3-x} dx;$$

$$\text{д) } \int 5^{7x-3} dx; \quad \text{е) } \int \frac{dx}{\cos^2\left(4 - \frac{x}{3}\right)}.$$

Решение. Данные интегралы могут быть найдены путем применения формул введения под знак дифференциала постоянного множителя и слагаемого к одному из табличных интегралов.

$$\text{а) } \int \sin(7x + 2)dx = \frac{1}{7} \cdot \int \sin(7x + 2)d(7x + 2) = -\frac{1}{7} \cdot \cos(7x + 2) + C$$

(см. табличный интеграл 7).

Заметим, что при $k \neq 0$ имеют место формулы

$$\int \sin(kx + b)dx = -\frac{1}{k} \cdot \cos(kx + b) + C$$

$$\int \cos(kx + b)dx = \frac{1}{k} \cdot \sin(kx + b) + C$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \int \sqrt[3]{3-x} dx &= -\int (3-x)^{1/3} d(3-x) = -\frac{(3-x)^{4/3}}{4/3} + C = \\ &= -\frac{3}{4} \cdot (3-x)^{4/3} + C \end{aligned}$$

(см. табличный интеграл 2).

Следует заметить, что в общем случае

$$\int (kx + b)^n dx = \frac{1}{k} \cdot \frac{(kx + b)^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, k \neq 0)$$

(см. табличный интеграл 3).

Пример 3. Найти интегралы

а) $\int x \cdot e^{-x^2} dx$;

б) $\int \frac{\cos x}{\sqrt[3]{\sin x + 2}} dx$;

Решение.

а) сделаем замену переменной полагая $t = -x^2$. Найдем дифференциал от левой и правой части формулы $t = -x^2$:

$$dt = d(-x^2) \quad \text{или} \quad dt = (-x^2)' dx.$$

Окончательно,

$$dt = -2x dx \quad \text{и} \quad x dx = -\frac{1}{2} dt.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int x e^{-x^2} dx &= \int e^{-x^2} \cdot x dx = \int e^t \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) dt = -\frac{1}{2} \int e^t dt = \\ &= -\frac{1}{2} e^t + C = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C \end{aligned}$$

(см. табличный интеграл 5).

б) Заметим, что $\cos x dx = d(\sin x) = d(\sin x + 2)$, тогда обозначим $t = \sin x + 2$ и применим формулу 2 из таблицы интегралов:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{\sqrt[3]{\sin x + 2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt[3]{\sin x + 2}} d(\sin x + 2) = \int \frac{1}{\sqrt[3]{t}} dt = \int t^{-1/3} dt = \\ &= \frac{t^{2/3}}{2/3} + C = \frac{3}{2} \cdot t^{2/3} + C = \frac{3}{2} (\sin x + 2)^{2/3} + C. \end{aligned}$$

Индивидуальные задания

Задание 1. Найти интеграл, результат проверить дифференцированием

1	$\int \frac{3dx}{\sqrt{4-x^2}}$	2	$\int \frac{5x^8+3}{x^3} dx$
3	$\int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$	4	$\int \frac{x^2+2}{x^2+1} dx$
5	$\int \frac{2^x-3^x}{4^x} dx$	6	$\int \frac{2dx}{x^2-9} dx$
7	$\int \frac{\sqrt{x^3}+1}{\sqrt{x}+1} dx$	8	$\int \frac{3-\sqrt{1+x^2}}{1+x^2} dx$
9	$\int \frac{2^x \cdot e^x - 1}{2^x} dx$	10	$\int \left(\frac{1-x}{x} \right)^2 dx$
11	$\int \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} dx$	12	$\int \frac{\sqrt{x^2-1}+3}{\sqrt{x^2-1}} dx$
13	$\int \frac{x^2+5x+6}{x+2} dx$	14	$\int \frac{1+2\sqrt{x^2+1}}{x^2+1} dx$
15	$\int \frac{7dx}{\sqrt{8-x^2}}$	16	$\int \frac{2x \sin^2 x + 3}{\sin^2 x} dx$
17	$\int \left(\sin x + \frac{e^x}{2} + \sqrt[6]{x} \right) dx$	18	$\int \frac{1-\sqrt{2-x^2}}{\sqrt{2-x^2}} dx$
19	$\int \frac{3^x+4^x}{2^x} dx$	20	$\int \frac{x^3+27}{x^2-3x+9} dx$

Задание 2. Найти интеграл, результат проверить дифференцированием.

1	$\int \sin \left(1 - \frac{2x}{3} \right) dx$	2	$\int \frac{1}{\sin^2(5x+1)} dx$	3	$\int \frac{1}{5-3x} dx$
4	$\int (1-5x)^{1/5} dx$	5	$\int \sqrt[3]{3-7x} dx$	6	$\int 2^{1-7x} dx$

7	$\int \cos\left(\frac{x}{2}+1\right) dx$	8	$\int \left(1-\frac{x}{2}\right)^4 dx$	9	$\int 2^{\frac{x+1}{2}} dx$
10	$\int \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{3}} dx$	11	$\int \frac{1}{(1-3x)^{1/5}} dx$	12	$\int \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{5}} dx$
13	$\int \frac{1}{(2x-1)^{1/2}} dx$	14	$\int \frac{1}{3-5x} dx$	15	$\int \frac{1}{1-7x} dx$
16	$\int \frac{1}{3^{2-4x}} dx$	17	$\int \sin\left(1-\frac{x}{3}\right) dx$	18	$\int \frac{1}{(2x-1)^3} dx$
19	$\int \frac{1}{4x-1} dx$	20	$\int \left(1-\frac{x}{4}\right)^5 dx$	21	$\int \cos\left(1-\frac{x}{7}\right) dx$

Задание 3. Найти интеграл, результат проверить дифференцированием.

1	$\int x \cos x^2 dx$	2	$\int x \cdot e^{1-x^2} dx$
3	$\int \frac{e^x}{1+e^x} dx$	4	$\int \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} dx$
5	$\int \frac{\operatorname{tg}^5 x}{\cos^2 x} dx$	6	$\int \frac{\cos x}{\sin^{3/5} x} dx$
7	$\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^6}} dx$	8	$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^6}}$
9	$\int \frac{e^x}{2+e^x} dx$	10	$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^4+1}} dx$
11	$\int 2^{x^2} \cdot x dx$	12	$\int e^x \cos(e^x) dx$
13	$\int x \cdot e^{4-x^2} dx$	14	$\int e^{x^3} \cdot x^2 dx$
15	$\int \frac{2^x}{2^x+3} dx$	16	$\int \frac{e^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$
17	$\int x^2 (2+x^3)^4 dx$	18	$\int (x^3-4x)^{10} (3x^2-4) dx$
19	$\int \frac{x}{1+4x^4} dx$	20	$\int \frac{e^{\operatorname{ctg} x}}{\sin^2 x} dx$

Задание 4. Найти интеграл, применив метод интегрирования по частям. Результат проверить дифференцированием.

1	$\int (x+1) \cdot e^{3x} dx$	2	$\int (2x-1) \sin 2x dx$
3	$\int \operatorname{arctg} 2x dx$	4	$\int \ln x dx$
5	$\int \arcsin(x+1) dx$	6	$\int (1-3x) \cdot 2^x dx$
7	$\int (4-3x) \cdot e^{-x} dx$	8	$\int \ln(1-x) dx$
9	$\int (2x-1) \cos x dx$	10	$\int x \ln 2x dx$
11	$\int (2x+1) \cdot e^{2x} dx$	12	$\int x \cdot 2^{-x} dx$
13	$\int (x+1) \operatorname{arctg} x dx$	14	$\int \arcsin(x+2) dx$
15	$\int (1-x) \ln x dx$	16	$\int \ln(1-3x) dx$
17	$\int (2x-3) \cos 3x dx$	18	$\int (x+1) \cdot \sin 5x dx$
19	$\int x \cdot e^{1-x} dx$	20	$\int \ln\left(\frac{x}{2} + 1\right) dx$

Контрольные вопросы

1. Дайте определение первообразной функции.
2. Что называется неопределенным интегралом?
3. Дайте определение операции интегрирования. Как проверить результат интегрирования?
4. Сформируйте основные свойства неопределенного интеграла.
5. Запишите соотношения, устанавливающие связи между интегрированием и дифференцированием.
6. Объясните суть непосредственного интегрирования.
7. В чем суть способа интегрирования, введением множителя $\varphi'(x)$ под знак дифференциала? Запишите соответствующую формулу.
8. Найдите интеграл $\int (5x-1)^2 dx$ двумя способами.
9. Напишите формулу замены переменной в неопределенном интеграле.
10. Напишите формулу интегрирования по частям для неопределенного интеграла.

Тема 6. Дифференциальное исчисление функции многих переменных

Пусть дана функция $z = f(x, y)$, определённая и непрерывная в некоторой области D . Полагая, например, $y = \text{const}$, получим производную $\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$, которая называется частной производной первого порядка функции z по переменной x . Она также может обозначаться $f'_x(x, y)$.

Аналогично, полагая $x = \text{const}$, получим производную $\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$, которая называется частной производной первого порядка функции z по переменной y . Она также может обозначаться $f'_y(x, y)$.

Частными производными второго порядка функции $z = f(x, y)$ называются частные производные от её частных производных первого порядка:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \text{ или } f''_{xx}(x, y); \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \text{ или } f''_{yy}(x, y); \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \text{ или } f''_{xy}(x, y); \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \text{ или } f''_{yx}(x, y). \end{aligned}$$

Имеет место теорема о равенстве смешанных производных.

Теорема Шварца. Если частные производные высшего порядка непрерывны, то смешанные производные одного порядка, отличающиеся лишь порядком дифференцирования, равны между собой. В частности, для $z = f(x, y)$ имеем: $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

Пример. Для функции $z = \cos(3x - 4y)$ найти частные производные второго порядка.

Решение.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= [y = \text{const}] = (\cos(3x - 4y))' = -\sin(3x - 4y) \cdot (3x - 4y)' = \\ &= -\sin(3x - 4y) \cdot (3 \cdot x' - 0) = -3 \sin(3x - 4y); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial y} &= [x = \text{const}] = (\cos(3x - 4y))' = -\sin(3x - 4y) \cdot (3x - 4y)' = \\
&= -\sin(3x - 4y) \cdot (0 - 4 \cdot y') = 4 \sin(3x - 4y); \\
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= [y = \text{const}] = (-3 \sin(3x - 4y))' = -3 \cos(3x - 4y) \cdot (3x - 4y)' = \\
&= -3 \cos(3x - 4y) \cdot (3 \cdot x' - 0) = -9 \cos(3x - 4y); \\
\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= [x = \text{const}] = (-3 \sin(3x - 4y))' = -3 \cos(3x - 4y) \cdot (3x - 4y)' = \\
&= -3 \cos(3x - 4y) \cdot (0 - 4 \cdot y') = 12 \cos(3x - 4y); \\
\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= [x = \text{const}] = (4 \sin(3x - 4y))' = 4 \cos(3x - 4y) \cdot (3x - 4y)' = \\
&= 4 \cos(3x - 4y) \cdot (0 - 4 \cdot y') = -16 \cos(3x - 4y).
\end{aligned}$$

Индивидуальные задания

Задание 1 Для функции $z = f(x, y)$ найти частные производные

$\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ и их значения в точке $x = x_0$, $y = y_0$.

Задание 2 Найти вторые частные производные

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

Задание 3 Найти полный дифференциал функции $z = f(x, y)$.

Задание 4 Найти градиент функции $z = f(x, y)$ в точке $x = x_0$, $y = y_0$.

Задание 5 Найти производную функции $z = f(x, y)$ в точке $x = x_0$, $y = y_0$ по направлению вектора $(1, 2)$.

Задание 6 Написать уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $z = f(x, y)$ в точке $x = x_0$, $y = y_0$.

Задание 7 Разложить функцию $z = f(x, y)$ по формуле Тейлора (при $n = 2$) в точке $x = x_0$, $y = y_0$.

№	$f(x,y)$	x_0	y_0	a	b	c	d
1	2	3	4	5	6	7	8
1	$\frac{x^2}{y^2} \cdot \sin(x-y)$	0.1	1.2	-4	1	1	2
2	$\frac{x}{y^2} \cdot \cos(x+y)$	-0.2	1.8	-2	2	1	2
3	$\frac{x}{y^2} \cdot \ln(x^2+y)$	-1	1.8	-2	3	1	3
4	$\frac{y-4}{\sqrt{y}+2x^2} \cdot (3+x+y)$	-2	4.5	-3	3	1	5
5	$\frac{\sin(y+x^2)}{\sqrt{y}+2x^2}$	-2	4.5	-3	2	0	5
6	$\frac{\cos(y^2x)}{y+2x^2}$	-2	1	-3	1	0.5	2
7	$\sin(x+2y) \cdot \cos(x^2)$	-0.2	1	-1	1	0.5	1.5
8	$\frac{\sin(x-y)}{2+\cos(xy)}$	-0.6	1.2	-2	0	0	1.5
9	$\frac{e^{x-y}}{1.25-\cos(xy)}$	-0.5	1	-0.7	0	0.5	1.3
10	$\frac{\operatorname{arctg}(x+y)}{\cos(x^2+y^2)}$	-0.6	1.6	-0.7	0	1.4	1.9

Контрольные вопросы

1. Записать формулы для вычисления площади плоской фигуры, заданной в декартовой системе координат, в полярной системе координат, параметрически.
2. Записать формулы для вычисления длины дуги плоской кривой, заданной в декартовой системе координат, в полярной системе координат, параметрически.

3. Записать формулы для вычисления объёма и площади боковой поверхности тела, полученного вращением дуги кривой вокруг оси OX и вокруг оси OY , заданной в декартовой системе координат, в полярной системе координат, параметрически.
4. Что такое частная производная?
5. Как формулируется теорема о смешанных производных?
6. Сколько различных частных производных 4-го порядка имеет функция от трёх переменных?
7. Что такое полный дифференциал? Его геометрический смысл?
8. Напишите уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности.
9. В чём заключается геометрический смысл градиента?
10. Что такое производная по направлению?

Тема 7. Дифференциальные уравнения

Определение. Функция $y = \varphi(x)$ называется решением дифференциального уравнения, если при подстановке функции в обе части уравнения получаем верное равенство, т. е. тождество.

Определение. Функция $y = \varphi(x, C)$, где C произвольная постоянная величина, называется общим решением дифференциального уравнения (8) в некоторой области D , если она удовлетворяет двум условиям:

1. При любом допустимом значении C функция $y = \varphi(x, C)$ – решение уравнения (8).

2. Для любой допустимой задачи Коши вида (9) существует постоянная C_0 такая, что выполнено равенство $y_0 = \varphi(x_0, C_0)$. Это означает, что для любой допустимой задачи Коши существует хотя бы одно решение.

Эти определения показывают самые общие свойства структуры решения. Они показывают, что решений уравнения бесконечно много и для выделения решения из общего множества нужно уметь решить задачу Коши. В аналитическом виде схема решения задачи Коши для уравнения (8) такова:

1. Нужно найти общее решение $y = \varphi(x, C)$.

2. Подставим в общее решение значения x_0 и y_0 и получим уравнение: $y_0 = \varphi_0(x, C)$.

3. Решим это уравнение и найдем C_0 .

4. Подставим значение C_0 в общее решение и найдем решение задачи Коши $y = \varphi(x, C_0)$.

Например, решение (3) является общим для уравнения (2). А решение (5) является решением задачи Коши.

Решение задачи Коши тоже может оказаться неединственным. Поэтому важно выявить условия, при которых решение задачи Коши единственно.

Теорема. Если функция $z = f(x, y)$ непрерывна и имеет частную производную по y , причем

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq M < \infty,$$

то уравнение (8) для любой задачи Коши имеет единственное решение. (Без доказательства).

Мы видим, что при достаточно широких условиях решение задачи Коши единственно.

Решение задачи Коши, если оно единственно и получается из общего решения при некотором значении C_0 , называется частным решением.

Кроме частных решений существуют еще особые решения, которые невозможно получить из общего.

Определение. Функция $y = \varphi(x)$ называется особым решением дифференциального уравнения, если оно является решением и не может быть получено из общего, как частное решение для некоторого значения C_0 .

Вначале мы рассмотрим методы решений дифференциальных уравнений первого порядка. Точные методы решений возможны лишь для узких классов дифференциальных уравнений. Мы рассмотрим основные.

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

$$y' = f(x)g(y),$$

где правая часть является произведением двух функций, из которых одна зависит только от x , а вторая только от y , называется уравнением с разделяющимися переменными. Запишем уравнение в виде

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \quad | \quad \cdot \frac{dx}{g(y)}$$

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx.$$

Последнее уравнение называется уравнением с разделенными переменными. Оно представляет собой равенство двух дифференциалов. Если два дифференциала равны, то равны и их неопределенные интегралы с точностью до постоянного слагаемого. Проинтегрируем это уравнение

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C.$$

Найдем, если это возможно, первообразную от правой и левой части. Полученное равенство называется **интегралом уравнения**. Выразим, если возможно, из полученного равенства y в явном виде. Получим общее решение данного уравнения.

Рассмотрим уравнение $g(y) = 0$.

Оно может иметь решения вида $y = y_k, k=1,2,3,\dots$. Так как производная постоянной равна нулю, то эти решения являются решениями данного уравнения. Убедиться в этом можно непосредственной подстановкой. При некоторых условиях они могут оказаться особыми. Рассмотрим уравнения более общего вида

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0. \quad \Big| \frac{1}{M_2(x)N_1(y)}$$

Разделим обе части уравнения на множитель $M_2(x)N_1(y)$ при условии, что $M_2(x)N_1(y) \neq 0$ и перенесем второй член вправо. Получим

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx = -\frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy.$$

Проинтегрируем равенство

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx = -\int \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy.$$

Получим интеграл данного уравнения.

Рассмотрим уравнения

$$M_2(x) = 0; \quad N_1(y) = 0.$$

Их решения могут дать особые решения рассматриваемого уравнения.

Функция $z = f(x, y)$ называется **однородной функцией порядка m** , если для любого λ выполняется равенство $f(\lambda x, \lambda y) \equiv \lambda^m f(x, y)$.

Дифференциальное уравнение первого порядка

$$y' = f(x, y),$$

называется **однородным**, если функция $z = f(x, y)$ является однородной функцией нулевого порядка, т. е. для любого λ выполняется равенство

$$f(\lambda x, \lambda y) \equiv f(x, y).$$

Положим $\lambda = 1/x$. Тогда

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x/x, y/x) = f(1, y/x).$$

Для решения однородного уравнения введем замену

$$u = y/x \quad \text{или} \quad y = xu.$$

Тогда

$$y' = x'u + xu' = u + xu'$$

и

$$f(x, y) = f(1, u).$$

Подставим функцию и ее производную в начальное уравнение

$$u + xu' = f(1, u)$$

или

$$x \frac{du}{dx} = f(1, u) - u. \quad \left| \frac{dx}{x(f(1, u) - u)} \right.$$

Уравнение полученное— это уравнение с разделяющимися переменными.

Пример. Найти решение уравнения

$$y'_x + xy = x^3,$$

Уравнение является линейным, в котором $P(x) = x$, $Q(x) = -x^3$.
Введем замену

$$y = uv, \quad y' = u'v + uv'.$$

Тогда

$$u'v + uv' + xuv = x^3.$$

Произведем группировку и выберем функцию v из уравнения

$$\frac{dv}{dx} + xv = 0.$$

Или

$$\frac{dv}{dx} = -xv. \quad \left| \frac{dx}{v} \right.$$

Разделим переменные

$$\frac{dv}{v} = -x dx.$$

Проинтегрируем

$$\int \frac{dv}{v} = -\int x dx.$$

Получим

$$\ln|v| - \ln|C| = -\frac{x^2}{2}.$$

Откуда

$$v = Ce^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Положим $C=1$. Тогда

$$u'e^{-\frac{x^2}{2}} = x^3 \quad \text{или} \quad \frac{du}{dx} = x^3 e^{\frac{x^2}{2}}.$$

Откуда

$$\begin{aligned} u = \int x^3 e^{\frac{x^2}{2}} dx &= \left[\begin{array}{l|l} u = x^2 & du = 2x dx \\ \frac{x^2}{2} & \frac{x^2}{2} \\ dv = x e^{\frac{x^2}{2}} dx & v = \int x e^{\frac{x^2}{2}} dx = e^{\frac{x^2}{2}} \end{array} \right] = \\ &= x^2 e^{\frac{x^2}{2}} - 2 \int x e^{\frac{x^2}{2}} dx = x^2 e^{\frac{x^2}{2}} - 2 e^{\frac{x^2}{2}} + C_1. \end{aligned}$$

Общее решение

$$y = uv = x^2 - 2 + C_1 e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Индивидуальные задания

Задание 1. Найдите общий интеграл дифференциального уравнения

1. $4x dx - 3y dy = 3x^2 y dy - 2xy^2 dx$
2. $x\sqrt{1+y^2} + yy'\sqrt{1+x^2} = 0$
3. $\sqrt{4+y^2} dx - y dy = x^2 y dy$
4. $\sqrt{3+y^2} dx - y dy = x^2 y dy$
5. $6x dx - 6y dy = 2x^2 y dy - 3xy^2 dx$
6. $(e^{2x} + 5)dy + ye^{2x}dx = 0$
7. $x\sqrt{3+y^2} dx + y\sqrt{2+x^2} dy = 0$

$$8. \quad y'y\sqrt{\frac{1-x^2}{1-y^2}} + 1 = 0$$

$$9. \quad 6xdx - 6ydy = 3x^2ydy - 2xy^2dx$$

$$10. \quad x\sqrt{5+y^2}dx + y\sqrt{4+x^2}dy = 0$$

Задание 2. Найдите общий интеграл дифференциального уравнения

1.	$y' = \frac{y^2}{x^2} + 4\frac{y}{x} + 2$	2.	$xy' = \frac{3y^3 + 2yx^2}{2y^2 + x^2}$
3.	$y' = \frac{x+y}{x-y}$	4.	$xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y$
5.	$2y' = \frac{y^2}{x^2} + 6\frac{y}{x} + 3$	6.	$xy' = \frac{3y^3 + 4yx^2}{2y^2 + 2x^2}$
7.	$y' = \frac{x+2y}{2x-y}$	8.	$xy' = 2\sqrt{x^2 + y^2} + y$
9.	$3y' = \frac{y^2}{x^2} + 8\frac{y}{x} + 4$	10.	$xy' = \frac{3y^3 + 6yx^2}{2y^2 + 3x^2}$

Задание 3. Найдите решение задачи Коши

$$1. \quad y' - \frac{y}{x} = x^2, \quad y(1) = 0$$

$$2. \quad y' - y \operatorname{ctg} x = 2x \sin x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$3. \quad y' + y \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x, \quad y(0) = 0$$

$$4. \quad y' + y \operatorname{tg} x = \cos^2 x, \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

$$5. \quad y' - \frac{y}{x+2} = x^2 + 2x, \quad y(-1) = \frac{3}{2}$$

$$6. \quad y' - \frac{1}{x+1}y = e^x(x+1), \quad y(0) = 1$$

$$7. \quad y' - \frac{y}{x} = x \sin x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$8. \quad y' + \frac{y}{x} = \sin x, \quad y(\pi) = \frac{1}{\pi}$$

$$9. \quad y' + \frac{y}{2x} = x^2, \quad y(1) = 1$$

$$10. \quad y' + \frac{2x}{1+x^2} y = \frac{2x^2}{1+x^2}, \quad y(0) = \frac{2}{3}$$

Задание 4. Найдите общий интеграл дифференциального уравнения

1	$y'''x \ln x = y''$	2	$xy''' + y'' = 1$
3	$2xy''' = y''$	4	$xy''' + y'' = x + 1$
5	$\operatorname{tg} x \cdot y'' - y' + \frac{1}{\sin x} = 0$	6	$x^2 y'' + xy' = 1$
7	$y''' \operatorname{ctg} 2x + 2y'' = 0$	8	$x^3 y''' + x^2 y'' = 1$
9	$\operatorname{tg} x \cdot y''' = 2y''$	10	$y''' \operatorname{cth} 2x = 2y''$

Тема 8. Числовые и функциональные ряды.

Гармонический анализ

Основные понятия числового ряда

Пусть задана последовательность чисел

$$u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, u_{n+1}, \dots$$

Выражение вида

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + u_{n+1} + \dots \quad \text{или} \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad (1.1)$$

называют *числовым рядом*.

Числа $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, u_{n+1}, \dots$ называются членами ряда, а u_n – n -ым или *общим членом ряда*. Ряд считается заданным, если задано правило, позволяющее по известному номеру n его члена записать этот член ряда.

Сумма n первых членов ряда (1.1) называется n -ой частичной суммой ряда и обозначается символом S_n :

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n \quad (1.2)$$

Если существует конечный предел $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, то говорят, что этот ряд сходится. В этом случае число S называется *суммой сходящегося ряда* (1.1). Если же частичная сумма S_n не имеет конечного предела при $n \rightarrow \infty$, то ряд (1.1) называется *расходящимся*, такой ряд суммы не имеет. Если ряд (1.1) сходится и его сумма равна S , то разность $S - S_n$ называется n -ым остатком ряда и обозначается R_n . Остаток $R_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots$ также является *числовым рядом*.

Обобщенный гармонический ряд

Обобщенным гармоническим рядом (рядом Дирихле) называется ряд вида:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad (1.3)$$

где p – любое действительное число. Как будет доказано ниже, этот ряд сходится при $1 < p$ и расходится при $1 \leq p$. Например,

$$\text{Например, } 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \text{ здесь } p = 2 > 1, \text{ ряд}$$

расходится.

$$\text{Ряд } 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{расходится, т.к. } p = \frac{1}{2} > 1$$

$$\text{Ряд } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{называется гармоническим, он}$$

расходится

Основные понятия функционального ряда

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad \text{называется функ-}$$

циональным, если его члены являются функциями от x , имеющими общую область определения. При одних значениях x из функционального ряда получаются числовые ряды, которые могут быть сходящимися или расходящимися. Если функциональный ряд сходится при $x = x_0$, то говорят, что ряд сходится в точке x_0 . Областью сходимости функционального ряда называется совокупность всех значений аргумента x , при которых этот ряд сходится.

Основные понятия степенного ряда.

Если члены $u_n(x)$ функционального ряда являются степенными функциями аргумента x , то ряд называется *степенным*. Степенным рядом называется ряд вида

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n,$$

где x_0 – данное число, $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ – известные числовые коэффициенты. В частности, если $x_0 = 0$, то получаем степенной ряд:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n, \quad \text{который всегда схо-}$$

дится при $x = 0$.

Пример 1. Запишите ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ в развернутой форме

$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$, если задан общий член $a_n = \frac{\sin \frac{\pi}{n+1}}{\sqrt{n \cdot 2^n}}$ ряда. Для этого найдите 5 первых членов ряда.

Решение.

Полагая:

$$n = 1, \text{ имеем } a_1 = \frac{\sin \frac{\pi}{1+1}}{\sqrt{1 \cdot 2^1}} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$n = 2, \text{ имеем } a_2 = \frac{\sin \frac{\pi}{2+1}}{\sqrt{2 \cdot 2^2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{6}}{8};$$

$$n = 3, \text{ имеем } a_3 = \frac{\sin \frac{\pi}{3+1}}{\sqrt{3 \cdot 2^3}} = \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\sqrt{24}} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{24}} = \frac{1}{\sqrt{48}} = \frac{\sqrt{3}}{12};$$

$$n = 4, \text{ имеем } a_4 = \frac{\sin \frac{\pi}{4+1}}{\sqrt{4 \cdot 2^4}} = \frac{\sin \frac{\pi}{5}}{8};$$

$$n = 5, \text{ имеем } a_5 = \frac{\sin \frac{\pi}{5+1}}{\sqrt{5 \cdot 2^5}} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\sqrt{160}} = \frac{1}{2\sqrt{160}} = \frac{\sqrt{10}}{80};$$

Ряд в развернутой форме записи имеет вид

$$\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{12} + \frac{\sin \frac{\pi}{5}}{8} + \frac{\sqrt{10}}{80} + \dots \frac{\sin \frac{\pi}{n+1}}{\sqrt{n \cdot 2^n}} + \dots$$

Пример 2. Вычислите сумму ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{5^n}$.

$$\text{Решение. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{3}{5}} - \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{2} - \frac{5}{3} = \frac{5}{6}.$$

Мы воспользовались формулой для суммы сходящейся геометрической прогрессии:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad (|q| < 1)$$

Пример 3. Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 2^n}{n + 2^n}$, применяя признаки сравнения.

Решение. Исследуемый ряд является рядом с неотрицательными членами, и для всех натуральных n выполняются неравенства

$$0 \leq \frac{\sin^2 2^n}{n + 2^n} \leq \frac{1}{n + 2^n} < \frac{1}{2^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Геометрическая прогрессия $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ сходится, т.к. ее знаменатель $q = \frac{1}{2}$ меньше единицы. Таким образом, по признаку сравнения сходится и данный ряд.

Пример 4. Исследовать сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot \sqrt[3]{n^2 + 3}}{(n + 2)!}$, применяя признак Даламбера.

Решение.

Исследуемый ряд является рядом с положительными членами. Найдем предел отношения $(n+1)$ -го члена ряда к n -ому члену ряда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1} \cdot \sqrt[3]{(n+1)^2 + 3}}{((n+1) + 2)!}}{\frac{2^n \cdot \sqrt[3]{n^2 + 3}}{(n + 2)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \cdot \sqrt[3]{(n+1)^2 + 3} \cdot (n + 2)!}{2^n \cdot \sqrt[3]{n^2 + 3} \cdot (n + 3)!} =$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot \sqrt[3]{n^2 + 2n + 4}}{\sqrt[3]{n^2 + 3}} \cdot \frac{(n+2)!}{(n+3) \cdot (n+2)!} = \\ = 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{n^2 + 2n + 4}{n^2 + 3}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+3)} = 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Итак $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, предел меньше единицы и, по признаку Даламбера, исследуемый ряд сходится.

Пример. Вычислить значение определенного интеграла

$$y = \int_0^1 \frac{e^{2x} - 1}{x} dx \quad \text{с точностью до } 0,001.$$

Решение.

Интеграл y является несобственным. Так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2$, то положим $F(0) = 2$.

Обозначим $f(x) = e^{2x} - 1$. Разложим $f(x)$ в степенной ряд

$$f(x) = e^{2x} - 1 = 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^3}{3!} + \dots + \frac{(2x)^n}{n!} + R_n(x),$$

где $R_n(x)$ - n -ый остаток, допускающий оценку Лагранжа.

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x|^{n+1}, \quad \text{где} \quad M = \max_{x \in [0,1]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

Так как $f^{(n+1)}(x) = e^{2x} \cdot 2^{n+1}$ и экспонента достигает максимального значения на правом конце отрезка, то $M = e^2 \cdot 2^{n+1}$. Следовательно,

$$|R_n(x)| \leq \frac{e^2 \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{9 \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!} |x|^{n+1}.$$

Значит,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx &= \int_0^1 \frac{e^{2x}}{x} dx = \int_0^1 \left(2 + \frac{2^2}{2!} x + \frac{2^3}{3!} x^2 + \dots + \frac{2^n}{n!} x^{n-1} + \frac{R_n(x)}{x} \right) dx = \\ &= \left(2x + \frac{2^2}{2! \cdot 2} x^2 + \frac{2^3}{3! \cdot 3} x^3 + \frac{2^4}{4! \cdot 4} x^4 + \dots + \frac{2^n}{n! \cdot n} x^n \right) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{R_n(x)}{x} dx = \\ &= 2 + \frac{2^2}{2! \cdot 2} + \dots + \frac{2^n}{n! \cdot n} + R_n, \end{aligned}$$

где $R_n = \int_0^1 \frac{R_n(x)}{x} dx$.

Оценим R_n сверху:

$$|R_n| \leq \int_0^1 \left| \frac{R_n(x)}{x} \right| dx \leq \int_0^1 \frac{9 \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!} |x|^n dx = \frac{9 \cdot 2^{n+1} \cdot |x|^{n+1}}{(n+1)!(n+1)} \Big|_0^1 = \frac{9 \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!(n+1)}.$$

Теперь подберем n так, чтобы

$$\frac{9 \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!(n+1)} < 0,001.$$

Для этого n будем иметь $|R_n| < 0,001$ и требуемая точность

$$n=8 \quad \frac{9 \cdot 2^9}{9! \cdot 9} = \frac{4}{2835} > 0,001;$$

$$n=9 \quad \frac{9 \cdot 2^{10}}{10! \cdot 10} = \frac{4}{15750} < 0,001.$$

$$\int_0^1 \frac{e^{2x} - 1}{x} dx \approx 2 + \frac{2^2}{2! \cdot 2} + \frac{2^3}{3! \cdot 3} + \frac{2^4}{4! \cdot 4} + \frac{2^5}{5! \cdot 5} + \frac{2^6}{6! \cdot 6} + \frac{2^7}{7! \cdot 7} + \frac{2^8}{8! \cdot 8} + \frac{2^9}{9! \cdot 9} \approx 3,7165,$$

$$3,7155 < J < 3,7175.$$

Необходимо взять в сумме 9 слагаемых, и необходимая точность будет достигнута.

Индивидуальные задания

Задание 1. Записать ряд в развернутой форме $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ если задан общий член a_n ряда. Выражение для общего члена взять в таблице

n	a_n	n	a_n
1	$\frac{n \cdot 2^n}{n!}$	2	$\frac{n^2}{(n+2)!}$
3	$\frac{(-1)^{n+1}}{n^2(n+1)^2}$	4	$\frac{n^2}{n!}$
5	$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}}$	6	$\frac{2n-1}{n^2(n+1)^2}$
7	$(-1)^n \cdot \frac{n^2+1}{2^n \cdot n!}$	8	$\frac{7 \cdot 13 \cdot 19 \cdot \dots \cdot (6n+1)}{(n^3)!}$
9	$(-1)^{n+1} \cdot \frac{n^2+1}{2^n}$	10	$\frac{n+1}{3n}$
11	$(-1)^n \cdot (2n-1)(2n+5)$	12	$\frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)}$
13	$(-1)^n \cdot \frac{1+2^n}{n^3}$	14	$\frac{1}{n^2} \cdot \sin \frac{\pi}{2^n}$
15	$\frac{-1+2 \cdot (-1)^{n+1}}{n!}$	16	$\frac{\ln n}{n}$
17	$(-1)^{n+1} \cdot \frac{n^2}{3^n \cdot (n+2)!}$	18	$\frac{\cos \frac{2\pi n}{3}}{\sqrt{n^2+1}}$
19	$(-1)^{n+1} \cdot \frac{n+2}{2^{n^2}}$	20	$\frac{1}{(n+1) + \sin n}$
21	$(-1)^n \cdot \frac{n \cdot 3^{n+1}}{2^n}$	22	$\frac{1}{n^{\frac{1}{n^2+1}}}$

Задание 2. Найти сумму ряда

n	a_n	n	a_n
1	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+5)(n+4)}$	2	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^{n-1}}{6^{n+1}}$
3	$\sum_{n=7}^{\infty} \frac{2}{(n-4)(n-6)}$	4	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+2^n)^2}{4^n}$
5	$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{3}{n(n-3)}$	6	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+5^n}{3^{2n-1}}$
7	$\sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{(n-9)(n-10)}$	8	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - 3^{n+1}}{3^{2n}}$
9	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+2) \cdot n}$	10	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2^n - 1)^2}{5^{n-1}}$
11	$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{2}{(n-2)(n-4)}$	12	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5^n + 1)^2}{3^{3n-1}}$
13	$\sum_{n=8}^{\infty} \frac{3}{(n-4)(n-7)}$	14	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n} + 3^n}{7^{n+1}}$
15	$\sum_{n=6}^{\infty} \frac{1}{(n-4)(n-5)}$	16	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 4}{2^{3n-1}}$
17	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+10)(n+8)}$	18	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n+1} - 5^n}{10^{n-1}}$
19	$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$	20	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^{2n}}{8^{n+1}}$

Задание 3. Исследовать сходимость ряда, применяя признаки сравнения

n	a_n	n	a_n
1	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2(n^2+4)}}$	2	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5^{n-1} + (n-1)}$
3	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$	4	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

5	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$	6	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{n}{n^2 + 1} \right)$
7	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n \sqrt{n}}{n \sqrt{n}}$	8	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 1}{3^n + 1}$
9	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2 + 1}$	10	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 5n}{n!}$
11	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5 + n^2 \cdot \sqrt[3]{n}}$	12	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 4n}}$
13	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$	14	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot \sqrt[3]{n+5}}$
15	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3 + 1}$	16	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4 + 9}$
17	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+5)}$	18	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 2^n}{n^2}$
19	$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \sin \frac{\pi}{2^n}$	20	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2 (n+1)^2}$

Задание 4. Исследовать сходимость ряда, применяя признак Даламбера, Коши (с радикалом) и интегральный признак Коши

n	a_n	a_n	a_n
1	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{2^n (n-1)!}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{-n^2}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$
2	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} \cdot \frac{1}{4^n}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1 + n^2}$
3	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 + 1}{n^2} \right)^n$	$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$
4	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n (2n)!}{2n!}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-2} \right)^{n^2}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1) \cdot (2n+3)}$

5	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+2}{(3n+5) \cdot 2^n}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+5} \right)^n$	$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$
6	$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot e^{-n}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+2}{2n^2+1} \right)^{n^3}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \cdot \ln^2(n+1)}$
7	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n-3}{5n+1} \right)^n$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3) \cdot \ln(n+3)}$
8	$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \cdot \left(\frac{2}{5} \right)^n$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{10n+5} \right)^{n^2}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{5n}$
9	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+5}{(n^2+2) \cdot 2^n}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{3n-1} \right)^{n^2}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^6+4}$
10	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^n \cdot \frac{1}{5^n}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln 2n}$

Задание 5. Найти область сходимости функционального ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x).$$

N вар.	$f_n(x)$	N вар.	$f_n(x)$
1	2	3	4
1	$\frac{(x+1)^n}{\sqrt{n}}$	2	$\frac{n^4+1}{2^n(x-2)^n}$
3	$\frac{(n+1)^5}{2n+3} (x+2)^n$	4	$\frac{(x-2)^{2n}}{(3n+1) \cdot 9^n}$
5	$\frac{(x+5)^{2n+1}}{4^n(n+2)^6}$	6	$\frac{(x-2)^n}{n \cdot 8^n}$
7	$\frac{n^4}{(n+1)!} \cdot (x+1)^{2n}$	8	$\frac{(x-2)^n \cdot 2^n}{n^{n+1}}$
9	$\frac{(x+3)^n}{2^n \cdot n^2}$	10	$\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1) \cdot \ln(n+1) \cdot (x-3)^n}$

11	$\frac{(-1)^n}{n^n} (x+1)^n$	12	$\frac{(x-1)^{2n}}{(n+1) \cdot 9^n}$
13	$\frac{n(n+1)}{n-3} (x-1)^n$	14	$\frac{3n+8}{n^2+4} (x-2)^n$
15	$\frac{(x-5)^n}{(n+4) \cdot \ln(n+4)}$	16	$\frac{\sqrt{2n+1}}{2^n \cdot (x+2)^n}$
17	$\frac{(-1)^n (x-2)^n}{(n+1) \cdot \ln(n+1)}$	18	$\frac{(-1)^n (x-3)^{2n}}{(2n+1) \cdot 16^n}$
19	$\frac{3n+2}{(n^2+9n+1)(x+2)^n}$	20	$\frac{n^2 \cdot x^n}{n!}$

Задание 6. Разложить функцию $f(x)$ в ряд по степеням $x - x_0$.

N вар	$f(x)$	x_0	N вар	$f(x)$	x_0
1	2	3	4	5	6
1	$\sin(x+3)$	0	2	$\frac{-3}{x^2+x-2}$	0
2	$\ln(10x-3)$	1	4	$\sqrt{2x+7}$	1
5	$\frac{1}{x^2-3x+2}$	0	6	$\ln(3x+2)$	1
7	e^{3x+2}	1	8	e^x	3
9	$\frac{2}{x^2-4x+3}$	0	10	$x^2 \cos(x+1)$	0
11	$\cos(x-2)$	0	12	$\frac{2x+2}{3x^2-2x-1}$	0
13	$\sqrt[3]{1+x^2}$	0	14	$x \cdot \sin(2x+1)$	0
15	$\ln(x+2)$	0	16	$\frac{\operatorname{sh} x}{x} + \cos x$	0
17	e^{2x+1}	2	18	$\sqrt[3]{1+x}$	7
19	$\frac{x+1}{2x^2+3x-2}$	0	20	$\ln(3x+1)$	0,2

Задание 7. Вычислить значение функции $f(x)$ в заданной точке x_0 ($f(x_0)$) с точностью до 0,001.

n	$f(x_0)$	n	$f(x_0)$	n	$f(x_0)$	n	$f(x_0)$
1	$\sqrt[3]{7}$	2	$\sin 0,21$	3	$\sqrt[3]{9}$	4	$\cos 0,22$
5	$1/\sqrt{e}$	6	$\ln 1,1$	7	$\cos 0,4$	8	$\sqrt[3]{10}$
9	$\ln 1,2$	10	$\sin 9^\circ$	11	$\ln 1,3$	12	$\sin 10^\circ$
13	$\sqrt[5]{36}$	14	$\sin 18^\circ$	15	$\sqrt[3]{1,06}$	16	$1/\sqrt[4]{e}$
17	$\sqrt[3]{145}$	18	$\cos 0,24$	19	$\sqrt[5]{246}$	20	$\ln 1,05$
21	$\cos 0,25$	22	$\sqrt[3]{72}$	23	$\ln 1,5$	24	$e^{-0,1}$
25	$\sin 36^\circ$	26	$\cos 15^\circ$	27	$\sqrt[3]{130}$	28	$\ln 1,08$
29	$\sin 0,4$	30	$1/\sqrt[3]{e}$	31	$\cos 0,31$	32	$\sqrt{27}$

Задание 8. Вычислить определенный интеграл $\int_0^b f(x) dx$ с точностью до 0,001.

N вар	$f(x)$	b	N вар	$f(x)$	b
1	$\cos x^3$	1	2	$\sqrt[4]{1+x^3}$	0,5
3	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	0,5	4	$\frac{\ln(1+x/2)}{x}$	1
5	$\frac{\sin x}{x} - 1$	0,5	6	$\frac{e^{2x^2} - 1}{x}$	0,1
7	$\frac{\sin 2x}{2} - x$	0,5	8	$\frac{\ln(1+3x)}{x}$	0,1
9	$\frac{\ln(1+x^2)}{x}$	0,8	10	$\sin \sqrt{\frac{x}{2}}$	0,5
11	e^{-2x^2}	0,2	12	$\frac{1}{\sqrt[3]{8+x^3}}$	1
13	$\frac{\operatorname{sh} x}{x} - \operatorname{ch} x$	1	14	$\frac{1}{x} \cdot \operatorname{arctg} x$	0,5
15	$\cos \sqrt{x}$	1	16	$x \ln(1+x^3)$	0,4

17	$\cos(10x^2)$	0,1	18	$\frac{e^{x^2} - 1}{x}$	1
19	e^{-7x^2}	0,5	20	$\operatorname{arctg} \sqrt{x}$	0,36

Контрольные вопросы

1. Понятия числового ряда, частичной суммы и остатка ряда, сходимости и суммы ряда.
2. Приближенное вычисление суммы ряда и оценка погрешности.
3. Операции над рядами (сумма и разность рядов, произведение ряда на число, произведение рядов). Теоремы о сходимости суммы и разности рядов, произведения ряда на число, произведения рядов.
4. Критерий Коши сходимости числового ряда.
5. Необходимые признаки сходимости рядов (два признака: в терминах членов ряда и частичных сумм ряда). Привести примеры, показывающие, что эти признаки не являются достаточными признаками сходимости.
6. Определение гармонического ряда. Почему этот ряд называется гармоническим? Что можно сказать о сходимости этого ряда?
7. Сформулировать признаки сравнения для рядов с положительными членами.
8. Сформулировать признак Даламбера. Привести примеры.
9. Сформулировать признак Коши с радикалом. Привести примеры.
10. Сформулировать интегральный признак Коши. Применить этот признак к исследованию сходимости гармонического ряда.
11. Что называется функциональным рядом?
12. Область сходимости функционального ряда.
13. Ряд Тейлора для функции $f(x)$ по степеням $x - a$.
14. Что называется степенным рядом?
15. Область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля.
16. Оценка остатка функционального ряда.
17. Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.
18. Теорема о непрерывности суммы функционального ряда.
19. Теорема о почленном интегрировании и почленном дифференцировании функционального ряда.
20. Равномерная сходимость степенного ряда. Теорема Вейерштрасса.

Тема 9. Интегральное исчисление функций многих переменных. Элементы теории поля.

Задача 1.

Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле

$$\int_1^3 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx.$$

Решение. Область интегрирования ограничена прямыми $y = 1$, $y = x/2$, $x = 0$, $x = 2y$. На рис.1. она представляет трапецию ABCD.




Рисунок 1. Область интегрирования

При интегрировании в другом порядке, вначале по y , необходимо разбить область ABCD прямой BN, параллельной Оу на две части, так как нижняя линия границы этой области состоит из двух частей АВ и ВС, которые имеют уравнения $y = 1$ и $y = x/2$.

Поэтому интеграл при изменении порядка интегрирования окажется равным сумме двух интегралов

$$\int_1^3 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx = \int_0^2 dx \int_1^3 f(x, y) dy + \int_2^6 dx \int_{x/2}^3 f(x, y) dy.$$

Задача 2.

Вычислить двойной интеграл $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}},$

где D — круговое кольцо, заключенное между окружностями $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$ (рис.2)




Рисунок 2. Область интегрирования D

Решение. Преобразуем двойной интеграл, отнесенный к декартовым координатам (x, y) , в двойной интеграл в полярных координатах (ρ, φ) . Имеем $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$. Якобиан соответствующего преобразования равен ρ .

Очевидно, что точкам $(x, y) \in D$ взаимно однозначно соответствуют точки (ρ, φ) области $G = \{(\rho, \varphi) : 0 \leq \varphi < 2\pi, 1 \leq \rho \leq 2\}$. Поэтому данный интеграл равен

$$\begin{aligned} \iint_G \frac{1}{\sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi}} \rho d\rho d\varphi &= \iint_G d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} \rho \Big|_1^2 d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi. \end{aligned}$$

Задачи 3-4

Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями $hz = x^2 + y^2$, $z = h$ ($h > 0$). Найти координаты центра масс тела, предполагая, что оно однородно

Решение. Данное тело ограничено снизу параболоидом $z = \frac{x^2 + y^2}{h}$, сверху плоскостью $z = h$ и проектируется в круг $x^2 + y^2 \leq h$ плоскости XOY .




Рисунок 3. Область интегрирования

Используем цилиндрические координаты:

$$x = \rho \cos \varphi,$$

$$y = \rho \sin \varphi,$$

$$z = z,$$

в которых уравнение параболоида будет

$$z = \frac{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi}{h}, \quad \text{т.е.} \quad z = \frac{\rho^2}{h}.$$

Объем тела равен

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{(V)} dx dy dz = \iiint_{(V^*)} \rho d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \rho d\rho \int_{\rho^2/h}^h dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \left(h - \frac{\rho^2}{h} \right) \rho d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{h\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4h} \right) \Big|_0^h d\varphi = \left(\frac{h^3}{2} - \frac{h^3}{4} \right) \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi h^3}{3}. \end{aligned}$$

Координаты центра масс тела вычисляются по формулам

$$X_c = \frac{M_{yz}}{M}, \quad Y_c = \frac{M_{zx}}{M}, \quad Z_c = \frac{M_{xy}}{M}, \quad \text{где}$$

$$M = \iiint_{(V)} \xi(x, y, z) dx dy dz,$$

$$M_{yz} = \iiint_{(V)} x \xi(x, y, z) dx dy dz,$$

$$M_{zx} = \iiint_{(V)} y \xi(x, y, z) dx dy dz,$$

$$M_{xy} = \iiint_{(V)} z \xi(x, y, z) dx dy dz,$$

где $\xi(x, y, z)$ – плотность тела в точке (x, y, z) . Для однородного тела можно положить $\xi(x, y, z) = 1$.

Находим:

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{(V^*)} \rho d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \rho d\rho \int_{\rho^2/h}^h dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \left(h - \frac{\rho^2}{h} \right) \rho d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{h\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4h} \right) \Big|_0^h d\varphi = \left(\frac{h^3}{2} - \frac{h^3}{4} \right) \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi h^3}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{yz} &= \iiint_{(V^*)} \rho^2 \cos \varphi d\varphi d\rho dz = \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^h \rho^2 d\rho \int_{\rho^2/h}^h dz = \\ &= \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^h \rho^2 \left(h - \frac{\rho^2}{h} \right) d\rho = \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^h \left(\rho^2 h - \frac{\rho^4}{h} \right) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} \cos \varphi \left(\frac{\rho^3}{3} h - \frac{\rho^5}{5h} \right) \Big|_0^h d\varphi = \int_0^{2\pi} \cos \varphi \left(\frac{h^4}{3} - \frac{h^4}{5} \right) d\varphi = \frac{2h^4}{15} \sin \varphi \Big|_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{zx} &= \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^h \rho^2 d\rho \int_{\rho^2/h}^h dz = \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^h \left(\rho^2 h - \frac{\rho^4}{h} \right) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{2h^4}{15} \cdot \sin \varphi d\varphi = \frac{2h^4}{15} \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi = -\frac{2h^4}{15} \cdot \cos \varphi \Big|_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \rho d\rho \int_{\rho^2/h}^h z dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \rho \frac{z^2}{2} \Big|_{\rho^2/h}^h d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \rho \left(\frac{h^2}{2} - \frac{\rho^4}{2h^2} \right) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \left(\frac{\rho h^2}{2} - \frac{\rho^5}{2h^2} \right) d\rho = \int_0^{2\pi} \left(\frac{\rho^2 h^2}{4} - \frac{\rho^6}{12h^2} \right) \Big|_0^h d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\frac{h^4}{4} - \frac{h^2}{12} \right) d\varphi = \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{h^4}{4} - \frac{h^2}{12} \right). \end{aligned}$$

Таким образом: $X_c = 0, \quad Y_c = 0, \quad Z_c = h - \frac{1}{3h}.$

Индивидуальные задания

Задание 1. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле, сделав чертеж области интегрирования.

№	Задание	№	Задание
1	$\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$	10	$\int_0^3 dy \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{3-y} f(x, y) dx$
2	$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$	11	$\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x, y) dy$
3	$\int_0^a dx \int_x^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x, y) dy$	12	$\int_{R/2}^{2R} dy \int_0^{\sqrt{2Ry-y^2}} f(x, y) dx$
4	$\int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$	13	$\int_2^6 dx \int_{2x-4}^{x+2} f(x, y) dy$
5	$\int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$	14	$\int_0^3 dy \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{6-2y} f(x, y) dx$
6	$\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$	15	$\int_0^4 dx \int_{\frac{16-x^2}{8}}^{\sqrt{16-x^2}} f(x, y) dy$
7	$\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy$	16	$\int_2^4 dx \int_0^{\sqrt{8x-x^2}} f(x, y) dy$
8	$\int_0^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy + \int_{-2}^0 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$	17	$\int_0^6 dx \int_{\sqrt{6x-x^2}}^{\sqrt{12x}} f(x, y) dy$
9	$\int_0^2 dy \int_{y-2}^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$	18	$\int_0^5 dy \int_{-\sqrt{25-y^2}}^{5-y} f(x, y) dx$

Задание 2. Вычислить двойной интеграл $\iint_D f(x,y) dx dy$. Предва-

рительно сделать чертеж области интегрирования.

№№	$f(x,y)$	Уравнения линий, ограничивающих область D
1	$\frac{y^2}{x}$	$y = x, y = 2x, x = 2, x = 4$
2	$x^3 y^2$	$x^2 + y^2 = R^2$
3	$x^2 + y$	$y = x^2, y^2 = x$
4	$\frac{x^2}{y^2}$	$x = 2, y = x, yx = 1$
5	$\cos(x + y)$	$x = 0, y = \pi, y = x$
6	$\sqrt{1 - x^2 - y^2}$	$x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$
7	$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, a > 1$	$y = x, y = -x, x^2 + y^2 = 1.$
8	$\sqrt{x^2 - y^2}$	$y = x, y = -x, x = 1$
9	$\frac{x}{\ell^y}$	$y^2 = x, x = 0, y = 1.$
10	$\frac{x}{x^2 + y^2}$	$y = \frac{x^2}{2}, y = x$
11	x	$x + y = 2, x^2 + (y - 1)^2 = 1$
12	y	$y = 0, (x - 1)^2 + y^2 = 1, (y \geq 0)$
13	$x + 2y$	$y = x - x^2, y = 1 - x^2, x = 0$
14	x^2	$y = \frac{1}{x}, x = 1, x = 2$

15	$\frac{x}{x^2 + y^2}$	$y^2 = 2px, x = p$
16	xy^2	$y^2 = 2px, x = p$
17	xy	$x^2 + y^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0$
18	y	$x^2 + (y - a)^2 = a^2$
19	$x^2 + y^2$	$x^2 + y^2 = 2ax$
20	$\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$	$x^2 + y^2 = a^2 (x \geq 0)$

Задание 3. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной данными линиями.

№№	Уравнения линий	№№	Уравнения линий
1	$x = y^2 - 2y; x + y = 0$	15	$3x^2 = 25y; 5y^2 = 9x$
2	$y = 2 - x; y^2 = 4x + 4$	16	$xy = 4; x + y = 5$
3	$y^2 = 4x - x^2; y^2 = 2x$ (вне параболы)	17	$x + y = 1; x + 3y = 1;$ $x = y; x = 2y$
4	$3y^2 = 25x; 5x^2 = 9y$	18	$\rho = 4 \sin \varphi; \rho = 2 \sin \varphi$
5	$y = 4x - x^2; y = 2x^2 - 5x$	19	$\rho = a \cos 2\varphi$
6	$x = 4 - y^2; x + 2y - 4 = 0$	20	$\rho = a \sin 3\varphi$
7	$\rho = 2(1 - \cos \varphi); \rho = 2$ (вне кардиоиды)	21	$(x^2 + y^2)^2 = 2y^3$
8	$\rho = 2(1 + \cos \varphi); \rho = 2 \cos \varphi$	22	$(x^2 + y^2)^3 = a^2(x^4 + y^4)$
9	$(x^2 + y^2)^5 = a^4 x^4 y^2$	23	$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$
10	$(x^2 + y^2)^3 = a^2 x^3 y$	24	$(x^2 + y^2)^2 = a^2 xy$

11	$(x^2 + y^2)^3 = a^4 x^2$	25	$y = \sqrt{x}; y = 2\sqrt{x}; x = 4$
12	$(x^2 + y^2)^5 = a^6 xy^3$	26	$(x^2 + y^2) = 2a^2(x^2 - y^2)$
13	$(x^2 + y^2)^3 = a^4 y^2$	27	$y = \cos x; y = \cos 2x;$ $y = 0; (x \geq 0)$
14	$x = y; x = 2y;$ $x + y = 6; x + 3y = 6$	28	$y = x; y = 5x; x = 1$

Контрольные вопросы

1. Двойной интеграл. Области интегрирования
2. Двойной интеграл в полярных и криволинейных координатах.
3. Якобиан преобразования координат
4. Геометрические приложения двойного интеграла
5. Тройной интеграл и его приложения
6. Криволинейный интеграл первого и второго рода
7. Работа по замкнутому контуру
8. Понятие и геометрический смысл градиента функции
9. Векторное и скалярное поля
10. Понятие дивергенции и ротора
11. Теорема Остроградского-Гаусса

Тема 10. Элементы теории функций комплексного переменного

Сведение функций комплексной переменной к функциям действительной переменной

Понятие функции комплексной переменной вводится по аналогии с понятием функции действительной переменной.

Пусть G – некоторое множество точек на комплексной плоскости. Задать функцию комплексной переменной (ФКП), определенную на G , значит указать правило, сопоставляющее каждому числу $z \in G$ некоторое комплексное число w (зависящее от z). Обозначение $w = f(z)$.

Положим $z = x + iy$, $w = u + iv$. Число w , а значит и каждое из чисел u и v зависит от x и y , т.е. является действительной функцией: $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$.

Обратно, если заданы две действительные функции u и v , определенные на некотором множестве G , то выражение $u(x, y) + iv(x, y)$ представляет собой ФКП $z = x + iy$.

Таким образом, задание на множестве G ФКП $f(z)$ равносильно заданию на G двух действительных функций $u(x, y)$ и $v(x, y)$. Связь между функциями f , u и v устанавливается с помощью равенства

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Примеры:

$$1. \quad w = z^2$$

$$w = (x + iy)^2 = x^2 + 2xyi - y^2 = (x^2 - y^2) + i2xy$$

$$u = (x^2 - y^2), \quad v = 2xy.$$

$$2. \quad w = \operatorname{Re} z \quad z = x + iy \quad \operatorname{Re} z = x \quad u = x \quad v = 0.$$

$$3. \quad u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$w = u + iv = \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{iy}{x^2 + y^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{1}{z}.$$

Предел ФКП в точке

Пусть z_0 — комплексное число и ε — положительное действительное число. Условимся называть ε окрестностью числа z_0 множество всех комплексных чисел, удовлетворяющих условию $|z - z_0| < \varepsilon$. Обозначение $u(z_0)$.

Геометрически ε -окрестность представляет собой внутренность круга радиуса ε с центром в точке z_0 .

Условимся также называть проколотой ε -окрестностью точки z_0 круг без его центра, т.е. множество точек z : $|z - z_0| < \varepsilon$, $z \neq z_0$. Обозначение $\dot{u}(z_0)$.

Определение. Пусть $f(z)$ — комплексная функция, определенная в некоторой окрестности точки z_0 , кроме быть может самой точки z_0 . Число c называется пределом функции $f(x)$ при $z \rightarrow z_0$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \dot{u}(z_0) : \dot{u}(z_0)$ выполняется неравенство $|f(z) - c| < \varepsilon$

Обозначение. $c = \lim_{z \rightarrow z_0} f(x)$.

Теорема (связь между пределами действительных и комплексных функций).

Пусть $z_0 = x_0 + iy_0$, $c = a + ib$. Тогда

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(x) = c \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = a, \\ \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ x \rightarrow x_0}} v(x, y) = b, \end{cases}$$

где $z = x + iy$, $f(x) = u + iv$.

С помощью этой теоремы известные свойства пределов действительных функций переносятся на комплексные функции:

1. предел от суммы равен сумме пределов;
2. предел произведения равен произведению пределов;
3. предел частного равен отношению пределов числителя и знаменателя, если предел знаменателя отличен от нуля.

Замечание. Определение предела дано без учета числа ∞ .

Дифференцирование ФКП

Определение. Пусть функция $f(z)$ комплексной переменной определена в некоторой окрестности точки z_0 . Производной этой функции в точке z_0 называется число

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}, \quad \Delta z = z - z_0.$$

Определение. Функция $f(z)$ называется дифференцируемой в точке z_0 , если ее приращение Δf в этой точке можно представить в виде

$$\Delta f = c\Delta z + \alpha\Delta z,$$

где $\Delta f = f(z) - f(z_0)$, $\Delta z = z - z_0$, c — некоторое комплексное число, не зависящее от Δz , а α — функция, зависящая от Δz , причем $\lim_{z \rightarrow z_0} \alpha = 0$.

Теорема (необходимое и достаточное условие дифференцируемости).

Для дифференцируемости функции $f(z)$ в точке z_0 необходимо и достаточно существование производной функции $f'(z_0)$.

Примеры:

1. Найти $f(z) = z^2$

$$\Delta f = z^2 - z_0^2 = (z_0 + \Delta z)^2 - z_0^2 = 2z_0\Delta z + (\Delta z)^2$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{2z_0\Delta z + (\Delta z)^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (2z_0 + \Delta z) = 2z_0$$

$$f'(z) = 2z.$$

2. $f(z) = \operatorname{Re} z$

$$z_0 = x_0 + iy_0 \quad \operatorname{Re} z = x_0$$

$$\Delta z = \Delta x + i\Delta y$$

$$\Delta f = x_0 + \Delta x - x_0 = \Delta x$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\Delta x}{\Delta x + i\Delta y} = \begin{cases} 0, & \Delta x = 0, \\ 1, & \Delta y = 0. \end{cases}$$

Нет единого предела при $\Delta z \rightarrow 0$, $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z}$ не существует, следовательно $f(z) = \operatorname{Re} z$ не дифференцируема.

Для функции комплексной переменной правила дифференцирования такие же, как и для функции действительной переменной

$$(f + g)' = f' + g'; \quad (cf)' = c \cdot f'; \quad (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g';$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}; \quad (f(g(z)))' = f'(g(z)) \cdot g'(z).$$

Операционное исчисление

Определение. Любая комплексная функция $f(t)$ действительного аргумента t называется оригиналом, если она удовлетворяет следующим условиям:

1) $f(t)$ – кусочно-непрерывная функция, т.е. на любом конечном отрезке имеет лишь конечное число точек разрыва 1-го рода;

2) $f(t) = 0$ при $t < 0$;

3) $f(t)$ – функция ограниченного роста, т. е. существуют такие постоянные $M > 0$ и s , что для всех t выполняется соотношение

$$|f(t)| < M \cdot e^{st} \quad (1)$$

Нижняя грань s_0 всех чисел s , для которых справедливо неравенство (1), называется показателем роста функции $f(t)$.

Простейшей функцией-оригиналом является так называемая единичная функция Хевисайда:

$$\eta(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Очевидно, умножение функции $\varphi(t)$ на $\eta(t)$ “гасит” эту функцию при $t < 0$ и оставляет без изменения при $t \geq 0$, т. е.

$$f(t) = \varphi(t)\eta(t) = \begin{cases} \varphi(t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Определение. Изображением функции $f(t)$ (по Лапласу) называется функция комплексного переменного $p = s + i\sigma$, определяемая соотношением:

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt, \quad (2)$$

где интеграл берется по положительной полуоси. Фразу “функция $f(t)$ имеет своим изображением $F(p)$ ” будем записывать символом:

$$f(t) \div F(p) \text{ или } F(p) \div f(t).$$

Теорема 1. Для всякого оригинала $f(t)$ изображение $F(p)$ определено в полуплоскости $\text{Re } p > s_0$, где s_0 - показатель роста для $f(t)$, и является в этой полуплоскости аналитической функцией.

Теорема 2. Если функция f является оригиналом и $F(p)$ служит ее изображением, то в любой точке t , в которой функция f непрерывна, справедливо равенство:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{pt} F(p) dp, \quad (3)$$

где интеграл берется вдоль любой прямой $\text{Re } p = a > s_0$ и понимается в смысле главного значения, т. е. как предел интеграла вдоль отрезка $[a-ib; a+ib]$ при $b \rightarrow \infty$.

Теорема 3. Оригинал $f(t)$ вполне определяется своим изображением $F(p)$ с точностью до значений в точках разрыва $f(t)$.

Теорема разложения. Пусть функция $F(p)$:

- 1) мероморфна и правильна в некоторой полуплоскости $\text{Re } p > s_0$;
- 2) существует система окружностей C_n : $|p| < R_n$, $R_1 < R_2 < \dots < R_n \rightarrow \infty$, на которой $F(p)$ стремится к нулю равномерно относительно $\arg p$;

- 3) для любого $a > s_0$ абсолютно сходится интеграл $\int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{pt} F(p) dp$.

Тогда оригиналом $F(p)$ служит (умноженная на $\eta(t)$) функция

$$f(t) = \sum_{(p_k)} \text{res}_{p_k} F(p) e^{pt}, \quad (4)$$

где сумма вычетов берется по всем особым точкам p_k функции $F(p)$ в порядке неубывания их модулей.

1. Свойство линейности. Для любых (комплексных) постоянных α и β : $\alpha \cdot f(t) + \beta \cdot g(t) \div \alpha \cdot F(p) + \beta \cdot G(p)$.

2. Теорема подобия. Для любого постоянного $\alpha > 0$

$$f(\alpha \cdot t) \div \frac{1}{\alpha} F\left(\frac{p}{\alpha}\right) \quad (5)$$

3. Дифференцирование оригинала. Если функция $f(t)$ непрерывна при $t > 0$ и $f'(t)$ или вообще $f^{(n)}(t)$ является оригиналом, то

$$f'(t) \div pF(p) - f(0) \quad (6)$$

или

$$f^{(n)}(t) \div p^n F(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0), \quad (7)$$

где под $f^{(k)}(0)$ понимается правое предельное значение $\lim_{t \rightarrow +0} f^{(k)}(0)$.

4. Дифференцирование изображения: Дифференцирование изображения сводится к умножению на $-t$ оригинала, или вообще

$$F^{(n)}(p) \div (-1)^n t^n f(t). \quad (8)$$

5. Интегрирование оригинала. Интегрирование оригинала сводится к делению изображения на p

$$\int_0^t f(t) dt \div \frac{F(p)}{p} \quad (9)$$

6. Интегрирование изображения. Если интеграл $\int_p^\infty F(p) dp$ сходится, то он служит изображением функции $f(t)/t$:

$$\frac{f(t)}{t} \div \int_p^\infty F(p) dp \quad (10)$$

(интегрирование изображения равносильно делению на t оригинала).

7. Теорема запаздывания. Для любого положительного τ

$$f(t-\tau) \div e^{-p\tau} \cdot F(p) \quad (11)$$

(включение оригинала с запаздыванием на τ равносильно умножению изображения на $e^{-p\tau}$).

8. Теорема опережения. Для любого положительного τ

$$f(t+\tau) \div e^{p\tau} (F(p) - \int_0^\tau f(t) e^{-pt} dt) \quad (12)$$

9. Теорема смещения. Для любого комплексного p_0

$$e^{p_0 t} \cdot f(t) \div F(p-p_0) \quad (13)$$

(“смещение” изображения на p_0 равносильно умножению оригинала на $e^{p_0 t}$).

10. Теорема умножения (Э. Борель) (или теорема о свертке). Произведение двух изображений $F(p)$ и $G(p)$ является изображением, причем

$$\int_0^t f(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau \div F(p) \cdot G(p) \quad (14)$$

11. Интеграл Дюамеля.

$$pF(p) \cdot G(p) \div f(0)g(t) + \int_0^t f'(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau \quad (15)$$

Кроме того, имеют место следующие предельные соотношения:

$$1) \lim_{\substack{p \rightarrow \infty \\ \operatorname{Re} p \rightarrow +\infty}} pF(p) = \lim_{t \rightarrow +0} f(t);$$

$$2) \lim_{\substack{p \rightarrow \infty \\ \operatorname{Re} p \rightarrow +\infty}} pF(p) = f(0), \quad \text{если существует предел}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty);$$

$$3) \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} dt = \int_0^\infty F(p) dp, \quad \text{если сходится несобственный интеграл}$$

$$\int_0^\infty \frac{f(t)}{t} dt.$$

Таблица оригиналов и их изображений

№	Оригинал	Изображение
1	$\eta(t)$	$\frac{1}{p}$
2	$e^{\alpha t}$	$\frac{1}{p - \alpha}$
3	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}, \quad n \in N$
4	$\sin \beta t$	$\frac{\beta}{p^2 + \beta^2}$

5	$\cos\beta t$	$\frac{p}{p^2 + \beta^2}$
6	$\operatorname{sh}\beta t$	$\frac{\beta}{p^2 - \beta^2}$
7	$\operatorname{ch}\beta t$	$\frac{p}{p^2 - \beta^2}$
8	$t^n e^{\alpha t}$	$\frac{n!}{(p - \alpha)^{n+1}}$
9	$e^{\alpha t} \sin\beta t$	$\frac{\beta}{(p - \alpha)^2 + \beta^2}$
10	$e^{\alpha t} \cos\beta t$	$\frac{p - \alpha}{(p - \alpha)^2 + \beta^2}$
11	$t \cdot \sin\beta t$	$\frac{2\beta p}{(p^2 + \beta^2)^2}$
12	$t \cdot \cos\beta t$	$\frac{p^2 - \beta^2}{(p^2 + \beta^2)^2}$

Индивидуальные задания

Задание 1. Пользуясь определением, найти изображения следующих функций:

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1. t | 1.2. $\sin t$ | 1.3. $\cos t$ |
| 1.4. $ch t$ | 1.5. e^t | 1.6. 2^t |
| 1.7. $\sin 2t$ | 1.8. $\cos 2t$ | 1.9. $sh 2t$ |
| 1.10. 3^t | 1.11. $1 - 2t$ | 1.12. $\sin 3t$ |

Задание 2. Найти оригиналы по заданным изображениям:

- | | | |
|------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3.1 | a) $\frac{p+4}{p^2+4p+5};$ | b) $\frac{pe^{-p}}{p^2-25}.$ |
| 3.2 | a) $\frac{1}{p^2+2p};$ | b) $\frac{e^{-4p}}{p^5}.$ |
| 3.3 | a) $\frac{3p-7}{p^2+4p+8};$ | b) $\frac{e^{-3p}}{(p+7)p}.$ |
| 3.4 | a) $\frac{5}{p(p^2-2p+5)};$ | b) $\frac{e^{-5p}}{p^2+9}.$ |
| 3.5 | a) $\frac{p}{p^2+8p+25};$ | b) $\frac{e^{-0,5p}}{(p-1)p^2}.$ |
| 3.6 | a) $\frac{10}{p(p^2+2p+10)};$ | b) $\frac{e^{-1,5p}}{p+7}.$ |
| 3.7 | a) $\frac{2-p}{p(p+3)};$ | b) $\frac{(p+1)e^{-3p}}{p^2+p+1}.$ |
| 3.8 | a) $\frac{p+3}{p(p-2)};$ | b) $\frac{e^{-2p}}{p^2-4p+13}.$ |
| 3.9 | a) $\frac{3p-2}{p^2+4p+3};$ | b) $\frac{e^{-3p}}{(p-8)p}.$ |
| 3.10 | a) $\frac{6p}{(p+3)(p^2+16)};$ | b) $\frac{e^{-4p}}{p^2-36}.$ |

Задание 3. Операционным методом решить дифференциальные уравнения, удовлетворяющие заданным начальным условиям:

$$4.1 \quad x'' + x' = 1 - t,$$

$$x(0) = x'(0) = 0;$$

$$4.3 \quad x'' - 4x' + 3x = 0,$$

$$x(0) = 6, x'(0) = 10;$$

$$4.5 \quad x'' + 4x' + 29 = 0,$$

$$x(0) = 0, x'(0) = 15;$$

$$4.7 \quad x''' - x'' = t,$$

$$x(0) = x'(0) = x''(0) = 0;$$

$$4.9 \quad x'' - 4x' + 5x = 0,$$

$$x(0) = 0, x'(0) = 1;$$

$$4.2 \quad x'' + x = 2e^{-t};$$

$$x(0) = 1, x'(0) = 0.$$

$$4.4 \quad x'' - x = \sin t,$$

$$x(0) = -1, x'(0) = 0.$$

$$4.6 \quad x'' - x' = te^t,$$

$$x(0) = x'(0) = 0.$$

$$4.8 \quad x'' + x' = \cos t,$$

$$x(0) = 2, x'(0) = 0.$$

$$4.10 \quad x'' + 3x' = e^t,$$

$$x(0) = 1, x'(0) = -2.$$

Контрольные вопросы

1. Комплексные числа и действия над ними
2. Дифференциальное исчисление функций комплексного переменного. Условие Коши-Римана
3. Вычеты и их применения
4. Преобразования Лапласа
5. Оригинал и изображение функции

Тема 11, 12. Теория вероятностей и математическая статистика

Теория вероятности имеет дело с явлениями, исход которых заранее предсказать невозможно. С такими явлениями часто приходится иметь дело, и потому необходима теория, которая могла бы описывать такие явления. Примеры таких событий: попадание при стрельбе, отказ механизма при запросе, выпадение герба при бросании монеты и т. д.

Испытание или опыт - создание некоторого комплекса условий, который мы, по крайней мере в принципе, можем воспроизводить многократно. Пример: стрельба по мишени, бросание монеты и т. д.

Событие или возможный исход - любое явление, которое может произойти или не произойти в результате опыта. Пример: промах при стрельбе по мишени, выпадение орла при бросании монеты, появление трех очков при бросании игральной кости (кубика) и т. д.

Различают элементарные неразложимые события и составные разложимые события

События обозначаются A, B, C и т. д.

Понятия испытания, исхода, элементарного события являются первичными понятиями теории вероятностей и потому формально они не определяются. Можно дать лишь некоторое их описание.

Событие называется достоверным, если оно обязательно происходит в результате испытания, обозначается U .

Событие называется невозможным, если оно никогда не может происходить в результате испытания, обозначается V .

Событие называется случайным, если оно может произойти в результате испытания, а может и не произойти.

Исходы опыта обязательно схематизируются, т. е. указываются заранее до опыта, и считается, что другие исходы невозможны. Из сказанного ясно, что в теории вероятностей рассматриваются только такие события, которые могут происходить в массовом порядке.

Пусть A и B два события.

Суммой двух событий A и B называется событие C , которое состоит в появлении или события A или события B или A и B совместно. Обозначается $A \cup B$ или $A+B$, читается A или B .

Произведением двух событий A и B называется событие C , которое состоит в появлении A и B совместно. Обозначается $A \cap B$ или AB , читается A и B .

Если в результате появления события A всегда происходит событие B , то говорят, что B является частным случаем A или B входит в A . Обозначается $B \subset A$.

Если $B \subset A$ и $A \subset B$, то говорят, что A и B эквивалентны. Обозначается $A = B$.

Событие, которое состоит в том, что событие A не происходит, обозначается $\bar{A}$, читается не A .

Пример 1. Опыт состоит в бросании игральной кости. Пусть событие A_i - выпадение числа i (i очков). Тогда событие D - выпадение четного числа очков равно $D = A_2 + A_4 + A_6$ и событие B - выпадение не более трех очков $B = A_1 + A_2 + A_3$. Событие $BD = A_2$, событие $A_1 \subset B$.

Для геометрических иллюстраций данных понятий используются диаграммы Вьенна. Изобразим пространство элементарных событий в виде квадрата, а события будем изображать заштрихованными подмножествами этого квадрата. Тогда




Рис.1. Геометрическая иллюстрация множественных понятий

Определение. Пусть пространство элементарных событий образует полную группу попарно-несовместных равновероятных событий E_i ($i=1,2, \dots, n$). Говорят, что E_i благоприятствует событию A , если $E_i \subset A$. Пусть событию A благоприятствует m из n событий полной группы. Тогда вероятность $P(A)$ события A равна:

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Пример. При однократном бросании игральной кости вероятность появления любого числа очков от 1 до 6 равна $1/6$, так как благоприятствует появлению события $m=1$ событие, а всего имеем полную группу из $n=6$ равновозможных событий, а вероятность появле-


ния четного числа очков равна 0,5 так как благоприятствует появлению события $m=3$ событий, а всего имеем группу из $n=6$ событий.

Классическое определение вероятности пригодно, в основном, для области азартных игр.

Элементы комбинаторики

При определении вероятностей классическим способом нужно рассматривать различные исходы опыта. При этом используются понятия комбинаторики. Опорный конспект по основным понятиям имеет вид

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО РАЗДЕЛУ "КОМБИНАТОРИКА"



Определение: вероятность события A при условии, что B произошло, называется условной вероятностью и обозначается $P(A/B)$.

Теорема. Вероятность $P(AB)$ произведения событий A и B равна произведению вероятностей $P(B)$ события B на вероятность события A при условии, что B произошло.

$$P(AB) = P(A)P(B/A) = P(B)P(A/B).$$

Доказательство. Пусть пространство элементарных событий состоит из n равновероятных и попарно-несовместных событий. Пусть

событию А благоприятствуют m событий, событию В - благоприятствуют l событий событию АВ благоприятствуют r событий ($r \leq l$, $r \leq m$). Тогда

$$P(AB) = \frac{r}{n}; P(B) = \frac{l}{n}; P(A/B) = \frac{r}{l};$$

$$P(AB) = \frac{r}{n} = \frac{l}{n} \frac{r}{l} = P(B)P(A/B);$$

Теорема доказана. Для общего случая формулу (3) принимают без доказательства в качестве определения. Из доказанного следует, что если $P(B) \neq 0$, то

$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)}; \quad P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

Если $P(B)=0$, то $P(A/B)$ не определено.

Определение. Событие В называется независимым от А, если $P(B/A)=P(B)$.

Следствие 1. Если В не зависит от А, то $P(AB)=P(A)P(B)$.

Доказательство следует из формулы (3) и условия $P(B/A)=P(B)$.

Следствие 2. Если В не зависит от А, то А не зависит от В. Следует из предыдущих формул.

Следствие 3. Если А не зависит от В, то независимы события А и $\bar{B}$; $\bar{A}$ и В; $\bar{A}$ и $\bar{B}$.

На практике независимость определяется из интуитивных соображений. Так очевидно, что попадание в мишень у одного стрелка не зависит от попаданий другого.

Пример. Три стрелка производят по мишени по одному выстрелу, вероятности попаданий соответственно равны: $p=0,8$; $q=0,6$; $r=0,5$. Найти вероятность того, что в мишени ровно два попадания.

Решение. Обозначим

А-событие “попадание 1-го стрелка”;

В-событие “попадание 2-го стрелка”;

С-событие “попадание 3-го стрелка”;

Д-событие “в мишени 2 попадания”.

Из условия имеем $D=AB \bar{C} + A \bar{B} C + \bar{A} B C$. Из теорем получаем

$$P(D)=P(A\bar{B}\bar{C})+P(A\bar{B}C)+P(\bar{A}BC)=P(A)P(B)P(\bar{C})+P(A)P(\bar{B})P(C)+P(\bar{A})P(B)P(C)=0,8*0,6*(1-0,5)+0,8*(1-0,6)*0,5+(1-0,2)*0,6*0,5=0,46.$$

Пусть имеется группа попарно-несовместных событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ и событие B , которое может произойти с одним и только с одним из событий $A_k, k = 1, 2, \dots, n$. Тогда

$$P(B) = P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2) + \dots + P(A_n)P(B/A_n) = \sum_{k=1}^n P(A_k)P(B/A_k).$$

Эта формула называется формулой полной вероятности.

Схема независимых испытаний

1. Формула Бернулли

Пусть A некоторое событие, вероятность появления которого в единичном испытании равна p . Проведем n испытаний. Если вероятность появления события A не зависит от числа проведенных и результата предыдущих испытаний и не изменяется при проведении испытаний, то мы имеем схему независимых испытаний. Обозначим вероятность того, что событие A появится k раз среди n испытаний буквой $P_n(k)$.

Обозначим B_i - слагаемое суммы. В каждом слагаемом событие A встречается в качестве сомножителя k раз и $\bar{A}$ $n-k$ раз. Вероятность слагаемого B_i равна $P(B_i)=p^k q^{n-k}$. Пронумеруем испытания номерами $j=1, 2, \dots, n$. Различные слагаемые определяются выбором номеров испытаний, при которых появляется A . Число различных попарно-несовместных слагаемых равно числу сочетаний из n элементов по k , обозначается C_n^k .

Откуда получаем:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

где

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

p - вероятность появления события в единичном испытании,

q - вероятность не появления события, $q=1-p$,

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n.$$

Эта формула называется формулой Бернулли.

Пример. Найти вероятность того, что при 7 бросаниях монеты 2 раза появится герб.

Решение. По условию $n=7$, $k=2$, $p=1/2$. Тогда

$$P_7(2) = C_7^2 0.5^2 0.5^5 = \frac{21}{128} \approx 0.164$$

Схема независимых испытаний определяет случайную величину, которая называется биномиально распределенной. Ее возможные значения равны $0, 1, 2, \dots, n$. На практике нужно уметь определять вероятность того, что число появлений события лежит в некоторых пределах. Для такого подсчета нужно подсчитать вероятность появления каждого значения, а затем просуммировать их. Схема независимых испытаний широко используется при статистическом контроле.

2. Локальная теорема Муавра-Лапласа

При достаточно больших n и k вычисления по формуле Бернулли становятся громоздкими. Поэтому для таких вычислений используются формула Муавра-Лапласа.

Теорема. Пусть вероятность появления события A в единичном испытании равна p ($0 < p < 1$). Тогда при $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x),$$

где

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}.$$

Теорема дается без доказательства. На практике вычисление вероятности по формуле (2) производят при достаточно больших n .

3. Интегральная теорема Муавра-Лапласа.

Обозначим $P_n(k_1 \leq m < k_2)$ вероятность того: что число появлений m лежит в пределах от k_1 до k_2 . Обратите внимание, что слева нестрогое неравенство, а справа строгое.

Теорема. Пусть вероятность появления события A в единичном испытании равна $p(0 < p < 1)$. Тогда при $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k_1 \leq m < k_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{x^2}{2}} dx,$$

$$\alpha = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}},$$

$$\beta = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}.$$

Теорема дается без доказательства. Для вычисления интеграла вводится функция

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

Ее значения приводятся в таблице в разных учебниках. Функция обладает свойством нечетности, т. е. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Индивидуальные задания

Задание 1 Решить комбинаторную задачу

1. Сколькими способами можно рассадить $2N + 4$ куста различных пород вдоль аллеи с двух сторон?
2. В магазин поступило $N + 8$ видов различных игрушек. Сколькими способами их можно расположить на витрине?
3. К бензоколонке одновременно подъехала $N + 1$ машина. Сколькими способами они могут организовать очередь?
4. Для производства продукции заводу-изготовителю нужно заключить $N + 5$ договоров с $N + 5$ заводами-поставщиками. Сколькими способами это можно сделать?
5. Станок с программным управлением выполняет $N + 7$ операций. Сколькими способами можно составить программу работы станка с выполнением всех операций по одному разу?
6. Месячный репертуар кинотеатра составляет $N + 10$ фильмов. Сколькими способами можно составить план проката кинофильмов, если каждый фильм можно показать один раз?
7. В конкурсе принимали участие $2N + 9$ детских садов. Сколькими способами могут распределиться места между ними?
8. В газете необходимо разместить $N + 8$ объявлений друг за другом. Сколькими способами это можно сделать?
9. В ансамбле $N + 6$ мужчин и $N + 6$ женщин. Сколькими способами их можно расставить на сцене в ряд так, чтобы никакие два мужчины и никакие две женщины не стояли рядом?
10. В библиотеке находится $N + 7$ видеокассет. Сколькими способами их можно расставить на полке?

Задание 2 Решить задачу, используя формулу Байеса

1. Вероятность поражения самолета при одиночном выстреле для первого ракетного расчета равна $0.02(N + 1)$, а для второго – $0.03(N + 1)$. Каждое из орудий производит по одному выстрелу, причем зарегистрировано одно попадание в самолет. Какова вероятность, что удачный выстрел принадлежит первому расчету?
2. Каждый из танков независимо сделал выстрел по некоторому объекту. Вероятность поражения цели первым танком равна 0.7 , вто-

- рым – $0.1N$. Объект поражен одним попаданием. Определить вероятность того, что объект поражен вторым танком.
3. Партия транзисторов, среди которых 10% дефектных, поступила на проверку. Сама проверка такова, что с вероятностью 0,9 обнаруживается дефект (если он есть) и существует ненулевая вероятность $0.01(N + 1)$ того, что исправный транзистор будет признан дефектным. Случайно выбранный из партии транзистор был признан дефектным. Какова вероятность того, что на самом деле транзистор исправен?
 4. На склад поступает продукция трех фабрик, приче продукция первой фабрики составляет $(20+2N)\%$, второй – 46%, остальные – третьей. Известно, что средний процент нестандартных изделий для первой фабрики равен $3N\%$, для второй – $2N\%$, для третьей – $N\%$. Найти вероятность того, что наудачу взятое нестандартное изделие произведено на первой фабрике.
 5. Однотипные приборы выпускаются тремя заводами в количественном отношении $N + 1$, $N + 2$, $N + 3$, причем вероятности брака для этих заводов соответственно равны 0,1; 0,2; 0,3. Прибор, приобретенный научно-исследовательским институтом, оказался бракованным. Какова вероятность того, что данный прибор произведен первым заводом (марка завода на приборе отсутствует)?
 6. На складе находятся детали, изготовленные на двух заводах. Известно, что объем продукции первого завода в $N+1$ раз превышает объем продукции второго завода. Вероятности брака на первом заводе 0,05, на втором заводе – 0,01. Наудачу взятая деталь оказалась бракованной. Какова вероятность того, что деталь изготовлена первым заводом?
 7. В группе из $N + 25$ человек, пришедших сдавать экзамен по теории вероятностей, имеется 10 отличников, 7 подготовленных хорошо, 5 – удовлетворительно, а остальные – плохо подготовлены. Отличники знают все 30 вопросов программы, хорошо подготовленные – $N + 20$, подготовленные удовлетворительно – 15, и плохо подготовленные знают 10 вопросов. Вызванный наудачу студент ответил на два заданных вопроса. Найти вероятность того, что студент подготовлен отлично или хорошо.
 8. Три стрелка производят по одному выстрелу в одну и ту же мишень. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для

каждого из стрелков соответственно равны $0,01N$, $0,01(N+1)$, $0,01(N+2)$. Какова вероятность того, что второй стрелок промахнулся, если после выстрелов в мишени оказалось две пробоины?

9. Прибор состоит из двух последовательно включенных узлов. Надёжность (вероятность безотказной работы в течение времени T) первого узла равна $0,01 \cdot (N+2)$, второго – $0,01 \cdot (N+5)$. За время испытания прибора в течение времени T зарегистрирован отказ прибора. Найти вероятность того, что отказал только первый узел.
10. В ящике находятся одинаковые изделия, изготовленные на двух автоматах: $10N$ изделий изготовлено первым автоматом, $30+N$ – вторым. Брак в продукции первого автомата составляет $2N\%$, второго – $3N\%$. Найти вероятность того, что случайно выбранное изделие изготовлено первым автоматом, если оно оказалось бракованным.

Список рекомендуемой литературы

8.1 Основная учебная литература

1. Балдин, К. В. Высшая математика : учебник: / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукоусев ; под общ.ред. К. В. Балдина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 360 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497> (дата обращения 22.08.2025). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.
2. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукоусев. – 4-е изд., стер. - Москва: Дашков и К°, 2021. – 472 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684276 (дата обращения 23.08.2025) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
3. Ильин, В. А. Аналитическая геометрия: учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – 7-е изд., стер. – Москва: Физматлит, 2009. – 224 с. – (Курс высшей математики и математической физики. Вып. 3).– URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797> (дата обращения 15.07.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.
4. Кундышева, Е. С. Математика : учебник / Е. С. Кундышева. - 4-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2015. – 562 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452840> (дата обращения 13.10.2023) . – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.
5. Мышлявцева М.Д. Интегральное исчисление функций нескольких переменных : учебное пособие / Мышлявцева М.Д., Соколовский М.Н., Троценко Г.А.. – Омск : Омский государственный технический университет, 2022. – 160 с. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/131198.html> (дата обращения 03.09.2025). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.

8.2 Дополнительная учебная литература

6. Бугров, Я.С. Сборник задач по высшей математике : учебное пособие / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. – 4-е изд. – Москва : Физматлит, 2001. – 301 с. –URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67851> (дата обращения 11.03.2023) . - Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.
7. Гусак, А.А. Высшая математика: учебник: в 2 томах / А.А. Гусак. – 7-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – Том 1. – 544 с. –URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572287> (дата обращения 10.09.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный.
8. Магазинников, Л.И. Высшая математика: дифференциальное исчисление: учебное пособие/ Л.И. Магазинников, А.Л. Магазинников. – Томск : ТУСУР, 2017. – 188 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481033> (дата обращения 02.09.2023) . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный.

9. Шевцова, Татьяна Васильевна. Аналитическая геометрия: учебное пособие для студентов 1-го курса технических направлений очного и заочного отделений / Т. В. Шевцова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 112 с. – Текст : непосредственный.
10. Шапкин, А. С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программированию : учебное пособие / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 10-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2021. – 432 с. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684406> (дата обращения 13.10.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.